

Über Derivate substituierter Malonsäuren.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
der
hohen philosophischen Fakultät
(Sektion II)
der
Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München
vorgelegt im November 1906
von
Heinrich von Diesbach
aus Freiburg in der Schweiz.

MÜNCHEN
Druck von Val. Höfling, Lämmerstrasse Nr. 1.
1907.

Über Derivate substituierter Malonsäuren.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

hohen philosophischen Fakultät

(Sektion II)

der

Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt im November 1906

von

Heinrich von Diesbach

aus Freiburg in der Schweiz.



MÜNCHEN

Druck von Val. Höfling, Lämmerstrasse Nr. 1.

1907.

Meinen lieben Eltern.

Vorliegende Arbeit wurde im chemischen Laboratorium der Akademie der Wissenschaften zu München ausgeführt.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinen hochverehrten Lehrern, Herrn Professor Dr. A. Einhorn, auf dessen Veranlassung diese Arbeit entstand, sowie Herrn Geheimrat Professor Dr. Ritter A. von Baeyer für das meinen Studien entgegengebrachte Interesse meinen ergebensten Dank auszusprechen.

Inhaltsübersicht.

Einleitung	Seite 9
Theoretischer Teil	19
Experimenteller Teil	50
I. Darstellung von Monoäthylthiobarbitursäure	50
Darstellung von Dimethylthiobarbitursäure	51
Darstellung von Dipropylthiobarbitursäure	52
Einwirkung von Amalgamen auf Thiobarbitursäuren	52
Bisdiäthylmalonyläthantetramin	54
Diäthylmalonylmethylendiamin	56
Symmetrisches N-Dichloraldiäthylmalonamid	60
II. Einwirkung von Anilin und Phenylhydrazin auf Diäthylthiobarbitur- säure	61
Diäthylmalonylphenylguanidin	61
Diäthylmalonylphenylaminoguanidin	62
III. Symmetrisches Tetramethyldiureid der Diäthylmalonsäure	62
Symmetrisches Tetraäthylidiureid der Diäthylmalonsäure	64
Symmetrisches Diphenylmethyldiureid der Diäthylmalonsäure	65
Diäthylmalonursäure	65
Einwirkung von Schwefelsäure auf Diäthylcarbonyldiharnstoff	66
IV. Dodekamolekulares Diäthylmalonsäureanhydrid	67
Tetramolekulares Anhydrid der Diäthylmalonsäure	77
Dodekamolekulares Dimethylmalonsäureanhydrid	78
Einwirkung von Äthylmalonylchlorid auf Pyridin	79
Einwirkung von Malonylchlorid auf Pyridin	80




Digitized by the Internet Archive
in 2026

Einleitung.


Einer der wichtigsten Körper der organischen Chemie ist ohne Zweifel der Malonester. Seine Bedeutung verdankt er der Eigenschaft, ein oder zwei an Kohlenstoff direkt gebundene Wasserstoffatome gegen Natrium vertauschen zu können; diese Natriumverbindungen sind von großer Reaktionsfähigkeit und deshalb zum Aufbau zahlreicher Körper verwendbar.

So lassen sich durch Einwirkung von Jod auf Natriummalonester¹⁾ zwei Moleküle Malonester zu Äthan- und Äthylentetracarbonsäureester vereinigen. Die Verkettung von drei Molekülen Malonester, wie sie von A. von Baeyer²⁾ durch Erhitzen der Natriumverbindung ausgeführt wurde, ermöglichte einen Übergang von der acyclischen zur cyclischen Körperreihe, die Darstellung des Phloroglucintricarbonsäureesters.



1) Bischoff, Ber. 16, 1046 [1883]; 17, 2781 [1884].


2) Ber. 18, 3454 [1885].



Natriumsalz des Phloroglucintricarbonester.

Diesen Beispielen der Kondensation von mehreren Malonester-molekülen stellt sich eine ungleich größere Anzahl von Verbindungen an die Seite, welche durch Umsetzung des Malonesters mit anderen Körpern entstehen.

Die Wasserstoffatome lassen sich nämlich leicht gegen Alkyle vertauschen durch Einwirkung von Halogenalkyl auf Natriummalonester, so daß mono- und disubstituierte Malonsäuren gebildet werden können. Diese Säuren nun verlieren beim Erhitzen auf höhere Temperatur CO_2 und gehen in Essigsäurederivate über, eine Methode, die oft vorteilhafter ist als die Acetessigestersynthese:




wo R und R' Wasserstoff oder Alkyl sein können.

Die substituierten Malonsäuren und Essigsäuren haben für die Arzneimittellehre eine besondere Bedeutung gewonnen, seitdem Fischer und Dilthey¹⁾ ihre Kondensationsprodukte mit Harnstoff dargestellt haben, die, wie Fischer und von Mering²⁾ zeigten, sich als wirk-same Arzneimittel erwiesen, so z. B. das „Veronal“ (Diäthylbarbitur-säure) und das „Proponal“ (Dipropylbarbitursäure). Der diesen Stoffen zugrunde liegende Körper ist die Barbitursäure, welche zuerst durch von Baeyer³⁾ aus Dibrombarbitursäure durch Reduktion mittelst Natriumamalyam oder Jodwasserstoff gewonnen wurde. Ein Beispiel aus der Essigsäurereihe ist das von Fuchs⁴⁾ dargestellte „Neuronal“ (Diäthylbromessigsäureamid).


Bemerkenswerter Weise haben die am Kohlenstoff sitzenden Alkylreste einen großen Einfluß auf die Reaktionsfähigkeit der zwei Carboxyle der Malonsäure. Das zeigt sich vor allem bei der Ver-seifung der Ester.

Michael⁵⁾ hat kürzlich die Verseifung der verschiedenen Malonester neuerdings studiert und gezeigt, daß die Verseifbarkeit mit dem Eintritt der Substituenten träger wird.

Die Verseifung der Malonester durch Kalilauge erfolgt unter intermediärer Bildung von einem Kaliummalonester, welcher nach der tautomeren Formel die Struktur besitzt:



Wenn die Lösung des Alkalis sehr verdünnt ist, so spaltet sich mit Wasser leicht Alkohol ab und es entsteht ein Äthylesterkaliumsalz:



Ist die Alkalilösung aber konzentriert, so kann der Kaliummalonester weniger leicht oder nicht hydrolysiert werden durch Wasser und in

1) Ann. 335, 334 [1900].

2) Therapie der Gegenwart 1903 Heft 3. Über eine neue Klasse von Schlafmitteln.

3) Lieb. Ann. 130, 136 [1864].

4) Zeitschrift für angew. Ch. 17, 1505; C. B. 1904 II 1666.

5) J. für pr. Ch. 72, 537 [1905].

solcher Lösung mehr oder minder beständig sein. So wird der Unterschied in der Verseifbarkeit ein und desselben Esters einerseits durch verdünnte, anderseits durch konzentrierte Kalilauge verständlich. Die Beständigkeit der verschiedenen Ester resp. ihrer Kaliumverbindungen aber gegen verdünnte und konzentrierte Alkalilösung überhaupt wird von den Substituenten modifiziert.

Malonester selbst wird von Alkali jeder Konzentration zum Kaliumäthylsalz verseift. Monoäthylmalonester erleidet mit verdünntem Alkali die gleiche Umwandlung, wird aber von 25 proz. Alkalilösung schon sehr schwer angegriffen; Diäthylmalonester aber wird sowohl von konzentrierter, als auch von verdünnter Alkalilösung nur mehr langsam verseift, Dimethylmalonester wiederum etwas leichter.

Das verschiedene Verhalten der Malonester wurde von Michael nach dem sog. „positiv-negativen Satz“ erklärt. Nach dieser Hypothese nimmt man an, daß negativ und positiv geladene Radikale existieren. Negative Radikale sind z. B.: $\text{CO}-\text{COOH}$, CHO , COOH , COOR , CH_2OH , CCl_3 , positive: CH_3 , CH_3-CH_2 , $\begin{smallmatrix} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{C} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{smallmatrix} > \text{CH}$. Diese Radikale sind nicht alle gleich stark positiv oder negativ. Die Gruppe COOH z. B. ist stärker negativ als die Gruppe CH_2OH . Bei den positiven Radikalen wächst die Positivität mit der Zahl der Alkyle, d. h. mit der GröÙe der Kohlenstoffkette.


Betrachten wir nun eine Säure, so sehen wir, daß sie aus einem positiven und einem negativen Radikal zusammengesetzt ist $\overset{+}{\text{CH}_3}-\overset{-}{\text{COOH}}$. Die positive und negative Energie dieser Radikale werden sich aber nur neutralisieren, wenn sie von derselben Stärke sind. Ist das nicht der Fall, so bleibt freie Energie zugunsten der einen Gruppe übrig, in diesem Falle zugunsten der negativen Carboxylgruppe. Diese freie negative Energie kann leicht positive Elemente oder Gruppen wie K.NH_3 KOH anziehen und die „freie“ Energie wird in „gebundene“ übergeführt. Tritt in der Säure an Stelle von $\overset{+}{\text{CH}_3}$ die Gruppe



welche stärker positiv ist als die erstere, so wird sie die negative Energie der COOH -Gruppe mehr neutralisieren, die Säure wird also schwächer werden.

Bei der Verseifung eines Esters greift das Alkali diejenige Stelle im Molekül an, wo die meiste freie negative Energie vorhanden ist, also das ungesättigte Carboxyl der Carboxäthylgruppe.

Jede Änderung in der Konstitution des Moleküls, z. B. der Eintritt von Alkylresten, vergrößert die Positivität und wird folglich eine gröfsere Neutralisierung der Atome des Carbonyls herbeiführen, daher eine Verwandlung von freier Energie in gebundene, welche Erschwerung der Verseifung zur Folge hat. Im Malonester bedingt die Anwesenheit von zwei Carboxäthylgruppen und ihre räumlich günstige Lage an freier negativer Energie reiche Carbonylgruppen.



Diese freie Energie wird von CC-Substituenten verschieden neutralisiert. Je gröfser die Alkylgruppen am Methylenkohlenstoff sind, desto positiver wird dieser und desto mehr neutralisiert er die freie Energie der Carboxäthylgruppen, die dann nur schwer mit dem positiven K reagieren können.

Nach dieser Hypothese läfst sich der Einflufs der Substituenten auf die Verseifungserscheinungen leicht erklären.

Auch bei den Malonylchloriden macht sich, wie wir später sehen werden, der Einflufs der Substituenten geltend.

Die verschiedenartige Beeinflussung der Malonsäure durch die Substituenten ist ferner deutlich erkennbar an der Art der Kondensationsprodukte der Malonsäure mit Harnstoff.

Malonsäure, Mono-methyl-, -äthyl- und Dimethylmalonsäure¹⁾ kondensieren sich leicht mit Harnstoff zu Barbitursäuren bei Gegenwart von Phosphoroxychlorid.

Diäthylmalonsäure aber und höhere Homologe geben mit Harnstoff unter CO₂-Abspaltung Derivate der Diäthyllessigsäure oder homologer Essigsäuren.²⁾

Als Kondensationsmittel können auch Phosphorpentachlorid, Thionylchlorid und rauchende Schwefelsäure dienen. Mit dem letztgenannten

1) Fischer und Dilthey, Ann. 335, 334 [1904]; Thorne, Journ. chem. Soc. 39, 545.





2) Ibid.

Kondensationsmittel gelang es Fischer und Diltthey¹⁾, sogar ein solierbares Zwischenprodukt zu erhalten, die Diäthylmalonursäure,



welche über den Schmelzpunkt erhitzt leicht unter CO_2 -Abspaltung in Diäthylacetylharnstoff überging.

Zur Erklärung dieser Erscheinungen nehmen die Autoren an, daß zuerst das Halbchlorid der Malonsäure entsteht, welches Harnstoff bindet; die entstandene Ursäure wird bei den höheren Homologen zer-
setzt unter CO_2 -Abspaltung; bei den Säuren, wo der Barbitursäurering sich noch bildet, ist die zweite $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$ -Gruppe fester gebunden und kann weiter chloriert werden:





Wir werden auf diese Annahme später noch einmal zurück-
kommen.

1) Ibid, 365.

Ferner haben Fischer und Dilthey¹⁾ konzentrierte wässrige Ammoniaklösung auf Malonester und substituierte Malonester einwirken lassen. Sie fanden, daß die Bildung eines Diamides unter Abspaltung von Alkohol so lange leicht erfolgt, als noch ein Wasserstoffatom am Kohlenstoff vorhanden ist. Mit CC-Dimethylmalonäthylester aber wurden nach 30stündigem Erhitzen mit alkoholischem Ammoniak bei 145° nur 2,6% der Theorie an Amid erhalten. Mit CC-Diäthylmalonäthylester fand überhaupt keine Umsetzung statt.

Zur Erklärung dieser Erscheinung nahmen die beiden Forscher an, daß sich zuerst ein Ammoniumsalz bilde, dem sie die tautomere Formel gaben. Dieses Ammoniumsalz spaltet leicht Alkohol ab und dasselbe Spiel wiederholt sich am zweiten Carboxyl.




Selbstverständlich können die disubstituierten Malonester nicht auf diese Weise reagieren.

Nun aber beobachtete Hans Meyer²⁾ die merkwürdige Tatsache, daß Dimethylmalonsäuredimethylester leicht mit wässrigem Ammoniak reagiert unter Bildung von Dimethylmalonamid in reichlicher Ausbeute. Auch Äthylmethylmalonsäuredimethylester gab eine reichliche Menge Amid. Dagegen wird Dimethylmalonsäurediäthylester oder Diäthylmalonsäuredimethylester gar nicht angegriffen.

1) Ber. 35, 845 [1902].

2) Wien, Monatshefte 1906. 31.

Es sind also zwei Äthylgruppen notwendig, um die Amidbildung zu verhindern.



geben mit wässrigem Ammoniak kein Amid.

Dieses Verhalten der Ester veranlafte Meyer¹⁾, auch das der entsprechenden Säurechloride zu studieren. Er fand, daß Malonyl-Monomethyl- und Monoäthylmalonylchlorid gänzlich von Ammoniak zersetzt werden, während Dimethyl- und Diäthylmalonylchlorid in Amide verwandelt werden. Für Äthylmethylmalonylchlorid gibt er an, daß man nur Äthylmethylacetamid bekomme; er liefs aber wahrscheinlich die Temperatur zu hoch steigen; denn Böttger²⁾ erhielt unterhalb 20° in der Tat Äthylmethylmalonamid.


In der Essigsäurereihe stellt Meyer das Verhalten des Trichloressigesters dem des Trimethylessigesters gegenüber³⁾. Während der erstere leicht mit Ammoniak unter Alkoholabspaltung reagiert, tut es der Trimethylessigester nicht mehr. Der Vergleich dieser Erscheinungen, die zum Teil mit der Annahme von Fischer und Dilthey nicht in Einklang zu bringen sind, veranlafte Meyer, die Amidbildung nach dem „negativ-positiven Satz“ von Michael in folgender Weise zu betrachten: Ist die Säure eine starke Säure, so ist die Absättigung der Valenzen der Carbonylgruppe eine geringe, Ammoniak addiert sich leicht unter Bildung eines Zwischenproduktes und bei weiterer Abspaltung von Alkohol entsteht Amid. Ist die Säure aber schwach, so sind die Valenzen der Carbonylgruppe stark abgesättigt und Ammoniak kann sich nicht addieren.

Folgendes Schema erläutert diese Betrachtungsart:

1) Ber. 39, 198 [1906].

2) C. B. I. 06. 1486.


3) Wiener Monatshefte 1906, 31.




Diese Erklärungsweise könnte auf die Amidbildung in der Malonsäurereihe ausgedehnt werden, denn diese Säuren besitzen jede eine verschiedene Menge freier negativer Energie. Doch sagt Meyer: „Nicht nur die Qualität der mit dem Carboxylkohlenstoff verbundenen Reste beeinflusst die Fähigkeit des Esters, sich in Amid verwandeln zu lassen, sondern auch die Anordnung der Substituenten im Raume.“ Diese Hypothese von der freien Energie erscheint also Meyer zur Erklärung seiner Versuche nicht genügend, nach welchen zwei Äthylgruppen die Amidbildung verhindern, mögen sie beide am Methylenkohlenstoff oder an den Carboxylen der disubstituierten Malonester sitzen.

Um eine wirklich befriedigende Theorie in diesem komplizierten Gebiete der Raumerfüllung aufstellen zu können, wäre es wünschenswert, noch weitere Beispiele kennen zu lernen, an welchen der Einfluss der Substituenten in der Malonsäurereihe studiert werden könnte. Im Verlauf der folgenden Arbeit wurden zwei neue Beispiele aufgefunden.

Das eine Beispiel betrifft die Reduktion der Thiobarbitursäuren mit Amalgamen. Es wurde nämlich gefunden, dass nur die CC-disubstituierten Barbitursäuren zu den entsprechenden Säureamiden reduziert werden und also der Einfluss der Substituenten noch in den Barbitursäuren fühlbar ist:



Das zweite Beispiel ist die Einwirkung von wässriger Pyridinlösung auf Malonsäurechloride. Hier zeigte sich, daß nur die CC-disubstituierten Säurechloride hochmolekulare Anhydride bilden können:



X = 12 oder 8.

Theoretischer Teil.

I. Einwirkung von Amalgamen auf Thiobarbitursäuren.

Läfst man Natriumamalgam auf Thioharnstoff einwirken, so wird derselbe nach *Bernthsen* kaum verändert.¹⁾ Symmetrischer Diphenylthioharnstoff gibt etwas Trithioformaldehyd.²⁾ Ganz anders aber verhalten sich nach meinen Versuchen die Thiobarbitursäuren.

Die Versuche wurden angestellt mit Thiobarbitursäure, C-Monoäthyl-, CC-Dimethyl-, CC-Diäthyl- und CC-Dipropylthiobarbitursäure. Als Amalgame dienten 3 % Natrium-, Ammonium-, 1,3 % Calcium-, 2 % Magnesiumamalgam und auch amalgamiertes Aluminium.

Alle Amalgame wirken in derselben Weise, aber mit verschiedenen Ausbeuten. Am besten erwies sich Natriumamalgam, obwohl die verseifende Wirkung des entstandenen Alkali zu fürchten war.

Wie gesagt, spielen die CC-Substituenten bei der Reaktion eine grofse Rolle.


In der gewöhnlichen Thiobarbitursäure scheint der Malonylrest keinen genügend grofsen Einfluß auf den Thioharnstoff auszuüben, um dessen Eigenschaften zu verändern. Der nascierende Wasserstoff greift die CS-Gruppe sehr schwer an; ist sie aber einmal angegriffen, so erleidet die Molekel eine so vollständige Zersetzung, dafs es nicht möglich war, ein einheitliches Zersetzungsprodukt zu isolieren. Ebenso verhält sich Monoäthylthiobarbitursäure. In diesen beiden Fällen läfst sich nicht einmal die Entstehung von Malonsäure resp. Monoäthylmalonsäure nachweisen.

1) Ann. 192, 55 [1878].

2) Merz u. Veith, Zeitschr. für Chemie 1869, 583.


Ganz anders verhält sich Diäthylthiobarbitursäure. In wässriger Lösung greift das Amalgam die CS-Gruppe spielend leicht an, wie die Entwicklung von H_2S erkennen läßt. Diese Gruppe ist durch den großen Molekelrest, der zwei Äthylgruppen enthält, sehr beweglich geworden. Ist sie aber angegriffen, so schützen diese Äthylreste die Molekel gegen weitere Zersetzung und es entsteht als Hauptprodukt der Reaktion Diäthylmalonamid (Sm. 224^o) ungefähr in 63% Ausbeute.

Der Prozess ist folgender:




Bei dieser Reaktion tritt Ameisensäure auf.

Säuert man die von Quecksilber und Diäthylmalonamid filtrierte Flüssigkeit mit Phosphorsäure an und destilliert, so geht gegen Ende der Operation bei 105^o ein Destillat über, das stark sauer reagiert. Diese Flüssigkeit ist verdünnte Ameisensäurelösung. Sie reduziert Permanganat in der Kälte, aus Silbernitratlösung oder Quecksilberchloridlösung scheidet sie beim Erwärmen Silber bzw. Calomel ab. Da Formaldehyd dieselben Reaktionen gibt, wurde noch das Verhalten der Lösung mit Quecksilberoxyd studiert. Dieses löst sich in Formaldehyd nicht, löst sich aber in der Kälte in Ameisensäurelösung, was in der Tat auch hier geschah; beim Erwärmen fiel HgCl und Hg met. aus. Nach Tollens¹⁾ gibt Phloroglucin und Salzsäure mit Formaldehyd eine weiße Trübung, die sich beim Erwärmen in dicke rôte Flocken umwandelt. Diese Reaktion trat nicht ein. Der Vorgang der Reduktion der Diäthylthiobarbitursäure kann demnach folgendermaßen erklärt werden: Der Schwefel wird zuerst durch den Wasserstoff als H_2S eliminiert und es entsteht das ungesättigte Radikal




Dieses addiert Wasser unter Sprengung des Ringes und bildet ein Zwischenprodukt


1) Ann. 299, 317 [1898].




Dieses Produkt wird sofort hydrolysiert durch ein zweites Molekül Wasser und wird in Ameisensäure und Diäthylmalonamid gespalten.




Wahrscheinlicher dürfte der Prozess so verlaufen, daß die Diäthylthiobarbitursäure, welche in Lösung wohl in der Pseudoform vorhanden ist, zuerst durch den naszierenden Wasserstoff den Schwefel als H_2S verliert und das Radikal



bildet, welches leicht 2 Mol. Wasser addiert und ein Additionsprodukt




bildet; dieses Produkt muß natürlich wegen der ungenügenden Sättigung der Valenzen des Kohlenstoffs höchst unbeständig sein und spaltet augenblicklich Ameisensäure unter Sprengung des Ringes ab und geht in das beständige Diäthylmalonamid über.



Für CC-Dipropylthiobarbitursäure ist der Vorgang ganz derselbe. Die Ausbeute beträgt sogar 66 % an Dipropylmalonamid. CC-Dimethylthiobarbitursäure bildet eine Zwischenstufe in ihrer Reaktionsfähigkeit. Das Schwefelatom wird zwar sehr schwer angegriffen, die zwei Methylgruppen genügen aber, den Methylenkohlenstoff des Malonylrestes vor weiterer Zersetzung zu schützen; es entsteht ebenfalls ein Amid, aber in einer Ausbeute von nur 10 %, während der gröfsere Teil der Dimethylthiobarbitursäure nicht angegriffen wird.

Aufser der Hauptreaktion, das heifst der Amidbildung, finden noch zwei Nebenreaktionen statt. Diese Nebenreaktionen bestehen in einer Reduktion; sie wurden bei der CC-Diäthylthiobarbitursäure studiert und auch bei der Dipropylverbindung die Entstehung ähnlicher Produkte nachgewiesen, aber nicht eingehender untersucht.


In diesen beiden Nebenprodukten ist das Kohlenstoffatom des Harnstoffes nicht eliminiert, nur der Schwefel ist durch Wasserstoff ersetzt:



Es handelt sich wohl um Nebenprodukte, nicht aber um Zwischenprodukte, da keiner dieser beiden Körper sich durch weitere Reduktion in Amid oder den anderen Körper überführen läßt.


Der eine, bei 293° schmelzende Körper ist Diäthylmalonylmethylendiamin. Er findet sich in dem Filtrate des ausgeschiedenen Diäthylmalonamids und wird, da er die Fähigkeit besitzt ein unlösliches Quecksilberdoppelsalz mit HgCl_2 zu bilden, mittels Sublimatlösung aus der Mutterlauge abgeschieden. Die zweite, bei 340° schmelzende Verbindung, die sich als Bisdiäthylmalonyläthantetramin erwies, hat stark saure Eigenschaften und wird deshalb durch Ansäuern des alkalischen Reaktionsgemisches nach der Reduktion isoliert.

Diäthylmalonylmethylendiamin (Sm. 293°). Dieser Körper, dem nach den Analysen und einer Molekulargewichtsbestimmung die Formel




zukommt, besitzt schwach basische Natur, die ihn befähigt, ein Doppelsalz zu bilden: $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2 + \text{HgCl}_2$ (Sm. 215°—218°). Auch mit konzentrierten Säuren bildet er Salze, die aber nicht isolierbar sind, da sie von Wasser oder beim Stehen im Exsiccator schnell zersetzt werden. Einhorn und Mauermaier¹⁾ versuchten, einen solchen Körper darzustellen aus dem von ihnen entdeckten Methylendiamin $\text{CH}_2 \begin{smallmatrix} \text{NH}_2 \\ \text{NH}_2 \end{smallmatrix}$, bekamen aber aus Diäthylmalonylchlorid mit der alkalischen Methylendiaminlösung ein Gemisch von

I. Bisdiäthylmalonylmethylendiamin



II. Bisdiäthylmalonylmethylendiamidsäure




Der Körper I ist unlöslich in Wasser, Alkalien und Mineralsäuren, ist also vollständig neutral. Die schwache Basizität des Diäthylmalonylmethylendiamins nun hat wahrscheinlich ihren Grund darin, daß noch ein Wasserstoffatom an jedes Stickstoffatom gebunden ist.

Es kann aus Sprit umkristallisiert werden, aus welchem es in glänzenden lichtbrechenden Pyramiden ausfällt, ist löslich in Äthylalkohol und Holzgeist, wenig in Äther, ziemlich in kaltem Wasser.

Von konzentrierten Säuren wird es in der Wärme gelöst und scheidet sich beim Erkalten als Diäthylmalonylmethylendiaminsalz der betreffenden Säure aus.


1) Ann. 343, 309 [1905].

Gegen konzentrierte Salpetersäure ist es selbst bei längerem Kochen beständig, ebenso gegen die Beckmannsche Mischung ¹⁾ (30 g Kaliumbichromat, 25 g konzentrierte SO_4H_2 und 150 g H_2O). Die zwei Wasserstoffatome der Methylengruppe konnten auch nicht austreten, um mit Bittermandelöl eine Verbindung




zu ermöglichen.

Dem **Bisdiäthylmalonyläthantetramin** (Sm. 340°) kommt stark saurer Charakter zu. Es ist löslich in Alkalien und wird von Säuren wieder ausgefällt. Kristallisiert man es dann aus Alkohol um, so bekommt man weiße glänzende Kristalle, die aber über 110° getrocknet an Gewicht verlieren (unter Verwitterung). Die bis zum konstanten Gewichte getrocknete Substanz stimmt auf eine Formel:



besser aber auf




Die Kristallwasserbestimmung und die Analysen des kristallwasserhaltigen Produktes weisen auf eine Formel $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$ oder besser $\text{C}_{16}\text{H}_{26}\text{O}_4\text{N}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ hin. Natürlich sind die Prozentwerte für beide Formeln sehr wenig verschieden.


Da der wasserfreie Körper in den üblichen Lösungsmitteln ganz unlöslich ist, so war ich gezwungen, zur Molekulargewichtsbestimmung mich der wasserhaltigen Verbindung zu bedienen. Ich bekam durch Bestimmung der Gefrierpunktniedrigung in Eisessig und der Siedepunkterhöhung in Alkohol die Werte 177 und 197. Die einfache Formel $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$ verlangt den Wert 188. Da ich es aber mit einem Hydrate zu tun hatte und der Körper außerdem stark sauer ist, so könnte wohl hydrolytische Dissociation eingetreten sein, so daß trotz der Annahme der doppelten Formel $\text{C}_{16}\text{H}_{26}\text{O}_4\text{N}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ nur ungefähr die Hälfte des verlangten Wertes (374) erhalten werden konnte (197).

1) Ann. 250, 325 [1889].


Dafs Molekulargewichtsbestimmungen Werte ergeben, die von dem berechneten Molekulargewicht verschieden sind, wurde schon in mehreren Fällen beobachtet, abgesehen von den niedrigeren Werten, die man in wässriger Lösung infolge elektrolytischer Dissociation sehr häufig erhält. So gibt Chloralhydrat¹⁾, welches das Molekulargewicht 165,5 besitzt, in Eisessig eine Gefrierpunktniedrigung, die einem viel niedrigeren Molekulargewicht entspricht; bei 0,266 % Verdünnung ergibt sich der Wert 109. Chloralalkoholat (Mol.-Gew. 193,5) gibt in Eisessig eine Erniedrigung des Gefrierpunktes, entsprechend dem Mol.-Gew. 139; diese Erniedrigung kann sogar bis zu dem Mol.-Gew. 100, d. h. die Hälfte des theoretischen Wertes wachsen. Acetal zeigt dieselbe Unregelmäßigkeit. Die Formel



kann für das saure Produkt nicht in Betracht kommen, da sie für den bei 293° schmelzenden Körper wahrscheinlicher ist. Eine andere Formel wie




erscheint gleichfalls unwahrscheinlich; die erste, weil das Amalgam schwerlich eine der Malonylcarboxylgruppen reduzieren und gleichzeitig die CS- in CO-Gruppe verwandeln würde. Nach einer Privatmitteilung von Herrn Professor Dr. Einhorn findet zwar eine solche Umwandlung von CS in CO bei der Diäthylthiobarbitursäure statt, aber erst beim Kochen mit konzentrierten Säuren entstand Diäthylbarbitursäure.




Nach der Formel II ist die Beständigkeit des Körpers gegen Oxydationsmittel (Kochen mit konzentrierter Salpetersäure oder Beckmannscher Mischung), denen die Hydroxylgruppe und die Doppel-

1) Beckmann, Zeitschr. für phys. Ch. [2] 1888, 726.

bindung nicht standhalten würde, nicht erklärlich. Die größte Wahrscheinlichkeit dürfte die doppelte Formel




besitzen. Diese Verbindung hat gewisse Ähnlichkeit mit der Hydurilsäure, welche A. v. Baeyer¹⁾ aus Dialursäure durch Erwärmen mit Glycerin als Lösungsmittel bekommen hat, wobei 1 Mol. Dialursäure zur Reduktion der vier anderen dient:



Die Hydurilsäure ist auch als Säure in Alkalien löslich, durch Säuren aber wieder fällbar. Aus konzentrierter Salzsäure fällt sie mit 2 Mol. Wasser, sonst mit 4 aq. heraus. Die zwei letzten Wassermoleküle verliert sie erst bei 140°. Der gefundene Körper verliert sein Wasser über 110° und zeigt dieselbe Löslichkeit in Alkalien.


Vergleichen wir die beiden Verbindungen nach ihrer Struktur, so sehen wir, daß sie beide aus je zwei Komplexen mit ähnlichen Atomgruppen zusammengesetzt sind und 2 Mol. Wasser enthalten.



1) Ann. 127, 14 [1863].

Doch besteht eine ziemliche Verschiedenheit zwischen den beiden Körpern. Während sie nämlich gegen Reduktionsmittel und Alkalien auch gegen Erhitzung gleich beständig sind, wird die Hydurilsäure von Oxydationsmitteln leicht angegriffen, was bei der anderen nicht der Fall ist. Dieses Verhalten ist aber leicht erklärlich, denn die Hydurilsäure besitzt zwei unveränderte Harnstoffreste, die leicht angegriffen werden. Die Alkalisalze der Hydurilsäure geben mit Eisenchlorid eine grüne Färbung, die des anderen Körpers dagegen nicht. Man kann die sauren Eigenschaften der Hydurilsäure auf Rechnung


der Reste $\text{CO}-\text{NH}-\text{CO}$ setzen, die tautomer $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{OH} \\ \diagup \\ \text{C}=\text{N}-\text{CO} \end{smallmatrix}$ reagieren können, denn diese Gruppen verursachen auch den sauren Charakter der substituierten Barbitursäuren. Doch reagiert auch das von Fischer und Dilthey¹⁾ dargestellte CC-Diäthylmalonylguanidin sauer, indem es ein durch Essigsäure zerlegbares Natriumsalz bildet. Ebenso verhält sich das später zu beschreibende Diäthylmalonylphenylguanidin



Es ist also zur Verursachung saurer Eigenschaften der Rest $\text{CO}-\text{NH}-\text{CO}$ nicht unbedingt notwendig.


So kann man verstehen, daß der fragliche Körper das Diäthylmalonyläthantetramin, trotz des Mangels einer solchen Gruppe, sauren Charakter besitzen kann. Es wurde auch versucht, das Natriumsalz der Verbindung zu isolieren. Es konnten aber für das erhaltene Produkt übereinstimmende Werte nicht gefunden werden. Der Mangel an Substanz verhinderte weitere Untersuchungen über die Konstitution des Körpers.

Die Einwirkung von Natriumamalgam auf CC-Diäthylthiobarbitursäure kann also auf dreierlei Art vor sich gehen. Hauptprozess ist die Amidbildung, indem die CS-Gruppe eliminiert wird (ung. 63%). Der zweite Prozess ist Ersetzung des Schwefels durch zwei Atome Wasserstoff unter Bildung von Diäthylmalonylmethylendiamin (ca. 17%). Drittens könnte man annehmen, daß der Schwefel eliminiert wird und die zwei ungesättigten Radikale




1) Ann. 335, 352 [1904].

zu einem ungesättigten Produkte sich vereinigen, das durch naszierenden Wasserstoff in ein gesättigtes überginge (ca. 14%).




Dipropylthiobarbitursäure




Auf diese Säure wirkt Amalgam wie auf Diäthylthiobarbitursäure. Die zwei Propylgruppen verursachen die leichte Angreifbarkeit des Moleküls und verhindern eine vollständige Zersetzung. Die Ausbeute an Amid ist noch etwas gröfser, als beim Diäthylmalonamid. Man bekommt ungefähr 66 % an Dipropylmalonamid. Auch hier treten die beiden Nebenprodukte auf: Eine unschmelzbare saure Verbindung und eine basische, die mit HgCl_2 ein unlösliches Salz gibt. Sie wurden aber nicht weiter untersucht.

C-Diäthylbarbitursäure



Die gewöhnliche Diäthylbarbitursäure wird von Amalgamen nicht angegriffen; beim Stehen (in wässriger Lösung) mit Amalgam erfolgt teilweise Verseifung in Harnstoff und Diäthylmalonsäure. Es ist also die Anwesenheit des Schwefelatoms notwendig, um den Angriff des naszierenden Wasserstoffes zu ermöglichen.

Symmetrisches N-Dichloraldiäthylmalonamid




Diesen Körper bekam ich, als ich versuchte, Diäthylmalonylmethylendiamin synthetisch darzustellen, um die zwei Nebenprodukte, die bei der Reduktion der Diäthylthiobarbitursäure entstehen, identifizieren zu können.

1) Fischer und Dilthey, Ann. 335, 337 [1904].

Zwei Wege waren mir schon in dieser Richtung verschlossen: Die Kondensation des Diäthylmalonylchlorides mit Methylendiamin, die nach Einhorn und Mauermaier nicht zum Ziel führen konnte, und der Umweg über die Methylolverbindungen.

Einhorn¹⁾ ist es gelungen, Säureamide und Formaldehyd in Reaktion zu bringen bei Gegenwart alkalisch oder sauer wirkender Kondensationsmittel. Die Reaktion vollzieht sich in folgendem Sinne:




Mineralsäuren verursachen weitere Kondensation:




wie es Einhorn²⁾ bei dem Methylolbenzamid bemerkte. Das entstandene Methylendibenzamid hatte schon Pulvermacher,³⁾ ohne die Methylolverbindung zu isolieren, direkt dargestellt.

Das einfachste Ausgangsmaterial wäre unter den zahlreichen, von Einhorn und seinen Schülern entdeckten Methylolverbindungen das symmetrische N-Dimethyldiäthylmalonamid gewesen. Einhorn und Spröngerts⁴⁾ hatten aber schon versucht, sei es durch Erwärmen des Produktes für sich oder durch Kochen seiner salzsauren Lösung einen Ring zu schließen, aber erfolglos.



Sie bekamen aber die Dimethylolverbindung des Methylenbisdiäthylmalonamids




1) Ann. 343, 209 [1906].

2) D.R.P. 148 669 [1903].

3) Ber. 25, 311 [1892].

4) Ann. 343, 272 [1905]; vergl. auch Spröngerts Dissertation, München 1905.


Es blieb mir nur übrig, Diäthylmalonamid mit einem anderen Aldehyd zu kondensieren, z. B. mit Chloral:




und dann die CCl_3 -Gruppe abzuspalten.

Es ist bekannt, dass Chloral, Bromal und andere halogenhaltige Aldehyde mit Säureamiden zu Verbindungen zusammentreten vom Typus ¹⁾ $\text{R}-\text{CH}(\text{OH})-\text{NHCOR}'$. Statt der erwarteten Ringbildung bekam ich diese Reaktion, als ich Diäthylmalonamid für sich oder mit Kondensationsmitteln auf Chloral oder Chloralhydrat in der Wärme einwirken liefs.


Das symmetrische N-Dichloraldiäthylmalonamid bildet ein in Wasser unlösliches weisses Pulver, das aus Sprit umkristallisiert bei 178° schmilzt und in seine Komponenten Chloral und Diäthylmalonamid zerfällt. Da Chloral die gewünschte Reaktion nicht gab, so versuchte ich aus Bittermandelöl und Diäthylmalonamid einen ringförmigen Körper zu bekommen.



Jedoch blieben alle in dieser Richtung angestellten Versuche erfolglos, obwohl Roth ²⁾ Acetamid und Benzamid in entsprechender Weise mit Benzaldehyd zur Reaktion gebracht hatte.



Aus allen diesen Fällen geht hervor, dass gegen die ringförmige Atomgruppierung



eine gewisse Spannung im Molekül vorhanden sein mufs. Das ist um so merkwürdiger, als im Gegenteil eine grosse Neigung zur Bildung

1) Schiff, Ber. 10, 168, 1786 [1877]; Pinner, Ann. 179, 40 [1875].


2) Ann. 154, 74 [1870].

des Barbitursäurerings existiert, wie wir später im dritten Teile dieser Arbeit sehen werden.


Ob hiebei die CC-Substituenten eine Rolle spielen, läßt sich vorderhand nicht beurteilen, da für diese Erscheinungen noch zu wenig Beispiele bekannt sind.

II. Über Kondensationen von Diäthylthiobarbitursäure mit Anilin und Phenylhydrazin.

Am Kohlenstoff gebundener Schwefel zeigt eine gewisse Reaktionsfähigkeit. Vor allem kann er mittelst Quecksilber- oder Bleioxyd durch Sauerstoff ersetzt werden, wie es bei den disubstituierten Thioharnstoffen vorkommt.¹⁾ Es kann bei dieser sog. Entschwefelung auch ein Molekül Wasser abgespalten werden wie bei der Bildung von Cyanamid aus Thioharnstoff²⁾:



Ganz eigentümlich ist die Fähigkeit des Schwefels der $>\text{C}=\text{S}$ -Gruppe, durch den Imidrest $=\text{NR}$ ersetzt zu werden, sei es direkt, sei es unter Anwendung von entschwefelnden Mitteln. Diese Beobachtung machten Merz und Weith³⁾, als sie aus Diphenylthioharnstoff und Kupfer bei 150° — 200° Triphenylguanidin erhielten. Bei diesem Prozeß liefert ein Molekül Diphenylharnstoff durch Zersetzung das nötige Anilin für die zwei anderen Moleküle:




1) Hoffmann, Ber. 2 [1869] 600.


2) Volhard, Journ. für prakt. Chemie [2] 9, 25 [1874].

3) Zeitschrift für Chemie 1868, 513.

Hoffmann¹⁾ konnte durch Einwirkung von Jod und Anilin auf Diphenylthioharnstoff denselben Körper darstellen:




Er konnte sogar beim Erhitzen der beiden Komponenten allein bis zum Siedepunkte des Anilins direkt Triphenylguanidin bekommen:



Bei den meisten anderen Thioharnstoffen muß man sich des Bleioxydes, Quecksilberoxydes oder der Quecksilbersalze bedienen, um den Schwefel leichter auszutreiben.

Hoffmann²⁾ bekam zum Beispiel aus Diäthylharnstoff und Diäthylamin mit HgO Triäthylguanidin, Tie mann³⁾ aus Diphenylthioharnstoff und Naphtylamin, in alkoholischer Lösung mit Bleioxyd gekocht, Diphenylnaphtylguanidin, Forster⁴⁾ bekam Triphenylguanidin aus Quecksilberphenylammoniumchlorhydrat und Diphenylthioharnstoff:



Bernthsen⁵⁾ dehnte diese Entschwefelungsmethode auf die von ihm studierten Thiamide aus, indem er diese Thiamide auf Ammoniak, Anilin oder andere Basen einwirken liefs unter Anwendung von Jod, Oxyden, Quecksilbersalzen oder dem salzsauren Salze der Base:




1) Ber. 2, 455 [1869].

2) loc. cit.

3) 3, 7 [1870].

4) Ber. 7, 294 [1874].


5) Ann. 184, 340 [1877].



Es sei noch erwähnt, daß die Umwandlung von Thioharnstoff in Guanidin¹⁾ bei hoher Temperatur auch auf eine Entschwefelungserscheinung zurückzuführen ist: Rhodanammonium setzt sich teilweise in Thioharnstoff um, und diese zwei Körper geben dann bei 200°:



Es frug sich also, ob der Schwefel der Thiobarbitursäurereihe sich auch wie der des Thioharnstoffes verhalten würde. Erhitzt man äquimolekulare Mengen von Diäthylthiobarbitursäure mit Anilin, so entweicht H_2S und es vollzieht sich ein ganz analoger Vorgang wie bei den Thioharnstoffen:



Das entstandene Diäthylmalonylphenylguanidin (Sm. 253°) kristallisiert aus Alkohol in glänzenden weißen Nadeln. Es hat die sauren Eigenschaften der Diäthylthiobarbitursäure und des von Fischer und


1) Volhard, Journ. für pr. Ch. [2] 9, 15 [1874].

H. v. Diesbach, Inaug.-Diss.


Dilthey¹⁾ entdeckten Diäthylmalonylguanidins behalten, denn es löst sich in Alkalien und wird von Säuren niedergeschlagen; doch bildet es nicht mit starken Mineralsäuren Salze wie die letztgenannte Verbindung.

Bemerkenswert ist, daß die Kondensation ohne Anwendung von Entschwefelungsmitteln vor sich geht, was in der Thioharnstoffreihe nur für Diphenylthioharnstoff der Fall war. Diese Beweglichkeit des Schwefels in der Diäthylthiobarbitursäure, die auch nach einer Privatmitteilung des Herrn Prof. Einhorn der Dimethylthiobarbitursäure zukommt, wäre wieder dem Einflusse der zwei Alkylgruppen zu verdanken, wie es bei der Einwirkung von Natriumamalgam der Fall war. Auch mit Thiobarbitursäure wurden Versuche angestellt. Sie bildet aber mit Anilin ein Salz, das beim Erwärmen auf höhere Temperatur nicht ganz entschwefelt wird. Die Versuche wurden nicht weiter verfolgt. Vielleicht reagiert Thiobarbitursäure wie die niedrig substituierten Harnstoffe und läßt sich nur bei Anwendung von Entschwefelungsmitteln ganz mit Anilin kondensieren.

Außer Anilin wurde auch Phenylhydrazin zur Kondensation verwendet. Nach Busch²⁾ verhält sich Hydrazin gegen Diphenylthioharnstoff in der Weise, daß unter Verdrängung eines phenylierten Ammoniakrestes Phenylthiosemicarbazid entsteht.



Diäthylthiobarbitursäure aber liefert beim Erwärmen mit Phenylhydrazin bei 120–130° Diäthylmalonylphenylaminoguanidin:




Es bildet aus Alkohol umkristallisiert schwach gelbsichtige Nadeln, die bei 215° schmelzen. Es löst sich in Alkalien und färbt dabei die Lösung intensiv blau, die Farbe geht aber bald in zwiebelrot über;

1) loc. cit.

2) Ber. 33, 1058 [1900].


versetzt man diese Lösung mit Alkohol, so fällt das Natriumsalz als blaues Pulver aus.

Diäthylmalonylphenylguanidin geht wie auch Diäthylmalonylphenylaminoguanidin beim Kochen mit Mineralsäuren unter Abspaltung der Imidgruppe in Diäthylbarbitursäure über.




III. Über Diureide der Diäthylmalonsäure.


Bekanntlich gibt Diäthylmalonylchlorid beim Erwärmen mit Harnstoff Ringschluss unter Bildung von Diäthylbarbitursäure.¹⁾ Wenn man aber asymmetrische Harnstoffe dazu verwendet, so kann, da die zwei Wasserstoffatome einer Amidogruppe durch Alkyl ersetzt sind, Ringschluss nicht erfolgen. Zwei Harnstoffmoleküle reagieren dann auf ein Diäthylmalonylchlorid unter Abspaltung von Salzsäure und man bekommt als Endprodukt ein Diureid der Diäthylmalonsäure



Die Reaktion vollzieht sich beim Erhitzen der Komponenten auf Wasserbadtemperatur oder etwas über 100°, sei es für sich, oder unter der Einwirkung von Pyridin als Kondensationsmittel. Indem ich as-Dimethyl-as-Diäthyl²⁾ und as-Phenylmethylnharnstoff³⁾ anwandte, bekam ich drei neue Diureide:



Symmetrisches Tetramethyldiureid der Diäthylmalonsäure (Sm. 158°).




Symmetrisches Tetraäthyldiureid der Diäthylmalonsäure (Sm. 125°).

1) Ann. 335, 337 [1904].

2) Franchimont, Recueil des trav. chim. des Pays Bas [2] 122, [3] 222.


3) Gebhardt, Ber. 17, 2095 [1884].




Symmetrisches Diphenylmethyldiureid der Diäthylmalonsäure (Sm. 172°).

Diese Körper zeigen Löslichkeit in Alkalien und werden von Säuren niedergeschlagen. Diese Eigenschaft ist wohl auf die zwei Wasserstoffatome der Gruppen —CO—NH—CO— zurückzuführen, da der Imidrest zwischen stark negativen Gruppen sitzt.

Beim Erwärmen auf dem Wasserbade mit einem Gemische von konzentrierter und rauchender Schwefelsäure erfolgt Ringschluss in quantitativer Ausbeute zu Diäthylbarbitursäure.



Diese Neigung zur Ringbildung zeigen mehrere ähnliche Verbindungen. Traube¹⁾ bekam auch Diäthylbarbitursäure, indem er Diäthylmalonylurethan mit Alkalien, Säuren oder Natriumalkoholat erwärmte:




Ebenso fanden Conrad und Zart²⁾ in ihrer Arbeit über Iminodialkylmalonylalkylharnstoffe, dass Diäthyl- und Dipropylmalonaminsäureester mit Natriumalkoholat und Harnstoff unter Abspaltung von Ammoniak Barbitursäuren geben. Die erste Hälfte der Reaktion zeigt nur die gewöhnliche Einwirkung des Natriumäthylates auf Harnstoff


1) D.R.Pat.-Ansp. T. 10008 IV/120 [1905].

2) Ann. 340, 350 [1905].


und Malonester. Aus der zweiten Phase aber erhellt die Neigung zur Ringbildung:




Ferner¹⁾ können die Dialkylcyanacetylharnstoffe durch Säuren in Dialkylmalonylharnstoffamide umgewandelt werden, welche mit konzentrierter Schwefelsäure in der Hitze ebenfalls Barbitursäuren liefern.



Ein weiteres Beispiel ist die von Einhorn gefundene, von den Höchster Farbwerken technisch verwertete Synthese der Diäthylbarbitursäure aus Diäthylmalonamid und Phenolcarbonat:



Merkwürdigerweise aber gibt Diäthylmalonylcarbonyldiharnstoff



nach v. Heyden weder beim Erwärmen mit 50 % Schwefelsäure, noch nach eigenen Versuchen mit rauchender Schwefelsäure, Diäthylbarbitursäure.

Jedenfalls besteht eine eigenartige Verschiedenheit zwischen den zwei Ringsystemen

1) Franz. Pat. 354, 452 [1905] E. Merck.

2) D.R.P. 165, 224, Juli 1904, Ch. Fabr. v. Heyden A.-G., Radebeul b. Dresden.




von denen das zweite bis jetzt noch nicht durch direkten Ringschluss synthetisch erhalten wurde.

Diäthylmalonylchlorid und Harnstoff in Pyridinlösung.


Tropft man unter Kühlung 1 Mol. Diäthylmalonylchlorid in eine Lösung von 1 Mol. Harnstoff in Pyridin, so bekommt man beim Ansäuern der Flüssigkeit einen Körper, der aus Wasser umkristallisiert, bei 160° schmilzt, und alle Eigenschaften der von Fischer und Dilthey¹⁾ beschriebenen Diäthylmalonursäure



besitzt. Wird aber die Reaktion auf dem Wasserbade ausgeführt, so tritt Ringschließung ein, und das Endprodukt ist Diäthylbarbitursäure, also dasselbe, wenn man nur das Chlorid mit Harnstoff erwärmt.²⁾




Im folgenden Abschnitte dieser Arbeit wird von der Einwirkung von Pyridin auf Säurechloride die Rede sein. Ich werde also hier diese Einwirkung nicht eingehender besprechen. Dieser Versuch macht es aber wahrscheinlich, daß sich ein Additionsprodukt an Pyridin gebildet hat, bei welchem Chlor und Carbonyl am tertiären Pyridinstickstoff sitzen, während die zweite COCl-Gruppe mit Harnstoff reagiert.




1) Ann. 335, 336 und 362 [1904].

2) ibid. s. 341.

Durch Annahme, daß sich ein solches Pyridinadditionsprodukt bildet, werden die beiden Vorgänge leicht erklärlich. Beim Ansäuern zersetzt sich das Additionsprodukt durch Hydrolyse:



Wird es aber erwärmt, so schließt sich der Ring und es entsteht Diäthylbarbitursäure:



Diese Entstehungsart der Diäthylbarbitursäure veranlaßte mich zu dem Versuche, direkt Diäthylmalonsäure unter Anwendung von Phosgen in Pyridinlösung auf Harnstoff einwirken zu lassen.


Einhorn¹⁾ hat in einer Reihe von Arbeiten gezeigt, daß die meisten Reaktionen, die sich mit Phosgen nur bei höherer Temperatur durchführen lassen, in Anwesenheit von Pyridin schon bei gewöhnlicher Temperatur eintreten. Bei diesen Reaktionen bildet das Pyridin mit Phosgen ein Additionsprodukt, welches sein Phosgen äußerst reaktiv abspalten kann. Dieses Produkt, das sog. „Pyridinchlorcarbonyl“

1) Einhorn und Hollandt, Ann. 301, 95 [1898]; Einhorn 300, 152 [1898]; Einhorn und Mettler, Ber. 35, 3647 [1902]; Einhorn, Cobliner und Pfeiffer, Ber. 37 106 [1904].

wurde sogar isoliert als ein in zitronengelben Nadeln kristallisierender Körper von der Formel ¹⁾ $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}-\text{CO}-\underset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{N}}}-\text{C}_5\text{H}_5$ (Bayer & Co., Elberfeld).

Da Phosgen imstande ist, Säuren in Säurechloride zu verwandeln, so konnte man erwarten, daß man durch Einwirkung von Pyridin und Phosgen auf Diäthylmalonsäure und Harnstoff ohne Isolierung des Säurechlorides Diäthylbarbitursäure erhalten würde; diese Hoffnung ging nicht in Erfüllung. In der Kälte trat keine Reaktion ein, in der Hitze bildete sich Diäthylacethylharnstoff, wie es Fischer und Dilthey auch mit Phosphoroxychlorid erhielten. Beim Einleiten von Phosgen in eine Lösung von Diäthylmalonsäure in Pyridin konnte man erwarten, daß das Säurechlorid entstehen würde. Liefs ich aber diese Lösung auf Harnstoff einwirken, so trat keine Kondensation ein.

Dieses Verhalten ist vielleicht darauf zurückzuführen, daß Phosgen das Halbchlorid der Diäthylmalonsäure erzeugt, welches unter Abspaltung von Salzsäure in ein Anhydrid übergeht.



Das Anhydrid reagiert wie wir im folgenden Abschnitte sehen werden mit Harnstoff nicht.

IV. Über Diäthyl- und Dimethylmalonsäureanhydride.


Die Einwirkung von tertiären Basen auf Säurechloride ist Gegenstand schon zahlreicher eingehender Untersuchungen gewesen. Vor allem hat Wedekind ²⁾ das Verhalten der tertiären Basen in einer Reihe von Abhandlungen besprochen und es in vier Fälle zusammengefaßt, von denen die folgenden zwei für die vorliegende Arbeit von Interesse sind:

1. Starke Säurehaloide und starke Tertiärbasen liefern unter Abscheidung des Hydrochlorides der Base chlor- und stickstofffreie Kon-


1) Centr.-Bl. 1900, II, 460, 930; 1901, I, 428, 429.

2) Ber. 39, 1631 [1906], 34, 2070 [1901]; Ann. 323, 246 [1903], 318, 99 [1901].


densationsprodukte, welche meistens die dreifache Molekulargröße des Säurehaloides —HCl besitzen. Propionylchlorid z. B. gibt



Eine Ausnahme bildet das Acetylchlorid ¹⁾, welches Dehydracetsäure $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_4$, also einen Körper von der vierfachen Molekulargröße gibt:



Bei diesen Reaktionen entstehen als Zwischenprodukte die sog. Ketene $\text{R}'\text{>C=C=O}$. Solche Ketene sind neulich von Staudinger und Klever ²⁾ isoliert worden. Diese Autoren ließen Bromisobutirylbromid in Essigesterlösung auf Zinkspäne einwirken; es entstand unter heftiger Reaktion Dimethylketen und Zinkbromid.



Dimethylketen bildet eine bei -20° haltbare gelbe Flüssigkeit, die sich aber bei Zimmertemperatur in ein Polymeres umwandelt, welches identisch ist mit dem von Wedekind und Weiswange ³⁾, aus Isobutirylchlorid und Triäthylamin dargestellten Diketon $[(\text{CH}_3)_2\text{C—CO}]_2$.

2. Wenn nur träge Reaktion mit tertiären Basen eintritt, so entsteht bei Anwesenheit von Feuchtigkeit Säureanhydrid. Dieser Fall wird uns am meisten beschäftigen.


Minunni ⁴⁾ ließ Benzoylchlorid auf Pyridin einwirken, versetzte mit etwas Wasser und erhielt so Benzoësäureanhydrid. Er nahm die Bildung eines quaternären Ammoniumsalzes als Zwischenprodukt an, so daß der Prozeß folgendermaßen vor sich ginge:

1) Dennstedt und Zimmermann, Ber. 19, 76 [1886].

2) Ber. 39, 968 [1906].

3) Dissert. Tübingen [1904].

4) Gazz. chim. ital. 22 II 213 [1892].



Zwei Jahre später teilte Denninger¹⁾ mit, wahrscheinlich ohne die Arbeit Minunnis zu kennen, daß er aus Benzoylchlorid mit Pyridin und calc. Soda beim Eingießen des Reaktionsproduktes in Wasser auch Benzoësäureanhydrid bekommen habe. Weiterhin hat Knoll & Co.²⁾ eine Darstellungsweise von gemischten Anhydriden aus Säurechlorid und Säure mittelst Pyridin patentieren lassen.



Dieser Vorgang ist nur ein Spezialfall der Reaktion von Säurechloriden mit der Hydroxylgruppe bei Anwesenheit von Pyridin, welche von Einhorn³⁾ zu einer eleganten Methode ausgearbeitet und als eine Reaktion von allgemeiner Bedeutung gezeigt wurde. So ließen sich von Einhorn und Hollandt auch Guayacol, Eugenol und β -Naphthol benzoylieren. Selbst in saurer Lösung und in der Kälte zu acylieren erlaubt diese Methode, indem man als Lösungsmittel Eisessig mit etwas Pyridin verwendet⁴⁾.

Inzwischen ist die Benzoylierung sauerstoffhaltiger Verbindungen unter Anwendung von Pyridin häufig ausgeführt worden, z. B. von Claisen⁵⁾, welcher mittels dieser Methode den Benzoylrest an dem

1) Journ. für prakt. Chem. 50, 479 [1894].

2) D.R.P. Nr. 117, 267.

3) Einhorn und Hollandt, Ann. 301, 95 [1898].

4) ibid.

5) Ann. 291, 110 [1896]; Ber. 31, 1023 [1898].


Ketonsauerstoff des Acetessigesters addieren konnte, während bei der Behandlung von Natracetessigester mit Benzoylchlorid in alkalischer Lösung die Benzoylgruppe an Kohlenstoff gebunden wird.

Es wird meistens bei diesen Reaktionen angenommen, daß ein Zwischenprodukt durch Addition des Säurechlorides an die tertiäre Base entsteht. Wedekind¹⁾ jedoch sagt, daß starke Säurehaloide und starke tertiäre Basen kein solches Zwischenprodukt geben können. Solche Zwischenprodukte sind aber mehrfach isoliert worden, z. B. das Pyridinchlorcarbonyl, von welchem wir vorher sprachen.

Eckstein²⁾ liefs Acetylchlorid auf Chinolin einwirken und erhielt bei Anschluß von Feuchtigkeit farblose Kristalle, die er zur Analyse bringen konnte. Die Analysenwerte stimmten auf ein Additionsprodukt von Acetylchlorid an Chinolin. Mit Benzoylchlorid und Chinolin bekam er ebenfalls ein Additionsprodukt, welches sogar im Vakuum destilliert werden konnte. In trockenem Zustande bleiben diese Produkte monatelang unverändert, es bildet sich kein salzsaures Chinolin.


Ein Additionsprodukt dieser Art ist auf keinen Fall beständig, wenn Wasser zugegen ist.

Wasserhaltiges Pyridin gibt mit Säurechloriden Anhydride:



Wedekind³⁾ stellte nach dieser Methode Isobuttersäure-, Brompropionsäure-, Zimtsäure- und Phenylelessigsäureanhydride dar. Er mischte das Chlorid mit Pyridin in ätherischer Lösung und setzte Wasser hinzu.

Da man in allen Lehrbüchern den Satz findet, daß Anhydride der Malonsäure nicht existenzfähig sind, war es nun von Interesse, das Verhalten von Malonsäurechloriden einer Untersuchung zu unterziehen. In derselben Zeit entdeckten Diels und Wolf⁴⁾ das „Kohlen-suboxyd“ C_3O_2 durch Einwirkung von Phosphorpentoxyd auf Malonester:




1) loc. cit.

2) Ber. 39, 2155 [1906].

3) Ber. 34, 2070 [1901].

4) Ber. 39, 690 [1906].


Kohlensuboxyd, eine bei 7° siedende Flüssigkeit, ist wohl Malonsäureanhydrid minus Wasser



Zwar verhält es sich wie ein wirkliches Anhydrid der Malonsäure, indem es mit Wasser sofort diese Säure gibt, mit Ammoniak Malonamid und mit Salzsäure sogar Malonylchlorid.

Ferner fanden diese Forscher, daß das Kohlensuboxyd sich leicht in ein rotbraunes Polymeres umwandelt, welches dieselbe empirische Zusammensetzung besitzt $[\text{C}_3\text{O}_2]_x$. Ein anderes kohlenstoffärmeres Polymeres bildet sich unter Verlust von CO, wenn man das Kohlensuboxyd erwärmt. Dieser Körper besitzt dann die empirische Formel C_4O_3 und erweist sich als identisch mit dem von Brodie¹⁾ dargestellten und auch von Berthelot²⁾ beschriebenen C_4O_3 , welches sie durch Einwirkung der stillen elektrischen Entladung auf Kohlenoxyd erhielten.

Merkwürdig ist auch, daß nach Leuchs³⁾ beim Erhitzen von Malonesterchlorid $\text{CH}_2 \begin{array}{c} \text{COCl} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$ auf 120°—130° unter Entwicklung von HCl zwei braune Körper entstehen. Der eine bei 175° schmelzende erwies sich als:



Der andere, welcher nur in Alkalien löslich und unschmelzbar war, gab Analysenwerte, welche nicht auf eine Formel stimmen konnte, nämlich C = 50,0%, H = 2,3%.

1) Ann. 169, 270 [1873].

2) Bull. soc. chim. [2] 26, 101 [1876].

3) Ber. 39, 2641 [1906].

Trägt man nun unter Kühlung Malonylchlorid in eine ätherische Pyridinlösung ein und tropft dann etwas Wasser zu, so bekommt man ebenfalls Ausscheidung eines braunen Körpers. Dieser ist aber kein Anhydrid der Malonsäure, da er mittels Alkalien nicht in diese Säure umgewandelt wird. Es besteht aus einem Gemische; ein Teil kann durch Extrahieren mit Xylol entfernt werden und gibt gelbe Kristalle, die bei 190° – 195° schmelzen, enthält aber Kohlenstoff und Wasserstoff sogar in der gleichen Portion in verschiedenen Verhältnissen. Ein anderer in Xylol unlöslicher Teil löst sich nur in Alkalien und starken Säuren und ist unschmelzbar. Er gab bei der Verbrennung verschiedene Analysenwerte. Diese Werte scheinen ziemlich mit denen übereinzustimmen, die der zweite von Leuchs beschriebene Körper aufwies [$C = 48,85$ $H = 2,62$ Leuchs $C = 50,00$ $H = 2,3$]. Auf Polymere des Kohlensuboxyds konnte wegen der Anwesenheit von H nicht geschlossen werden.


Monoäthylmalonylchlorid verhält sich gegen Pyridin und Wasser wie Malonylchlorid. In diesem Falle aber sind die Zersetzungsprodukte flüssig und können nie gut von etwas Äthylmalonsäure und von dem Pyridin getrennt werden, um identifiziert zu werden.

Ganz anders verhält sich Diäthylmalonylchlorid: Tropft man es unter Umrühren in eine wässrige Pyridinlösung ein, so scheidet sich bald ein voluminöser gelblicher Körper aus, der nach dem Behandeln mit verd. Soda, Salzsäure und Wasser auf die empirische Formel $C_7H_{10}O_3$ stimmt.

Dieses amorphe Anhydrid liefert mit Natronlauge in der Kälte Diäthylmalonsäure, mit Ammoniak neben dieser Säure Diäthylmalonamid und Diäthylmalonamidsäure




welche in derselben Zeit von Conrad ¹⁾ beschrieben wurde. Mit Diäthylamin entstehen bei niedriger Temperatur außer Diäthylmalonsäure Diäthylmalondiäthylamidsäure



1) Ann. 340, 349 [1905].

(lange Prismen Sm. 88° — 90° unter CO_2 -Entwicklung) und auch etwas Diäthyllessigsäurediäthylamid ¹⁾, eine schwach nach Menthol riechende Flüssigkeit (Sd. 108° bei 12 mm). Mit Natriumalkoholat in der Wärme bildet das Anhydrid Diäthylmalonester und Diäthylmalonester-säure. Mit Harnstoff reagiert es nicht.

Alle diese Reaktionen zeigen wohl den Anhydridcharakter dieser amorphen Verbindung:




Eigentümlich ist das Verhalten des Anhydrids beim Erhitzen über den Schmelzpunkt oder beim Kochen in indifferenten Lösungsmitteln wie Benzol oder Essigester. In diesem Falle zersetzt sich ein Teil des Anhydrids und gibt Kohlensäure und Diäthyllessigsäureanhydrid.

Ein anderer Teil aber verwandelt sich in einen schönen, aus der Lösung in rhombischen Tafeln kristallisierenden Körper, der wieder die empirische Formel $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_3$ besitzt und bei 220° schmilzt. Dieses zweite Anhydrid reagiert viel träger als das erste; durch Alkalien wird es nur langsam verseift, mit Ammoniak und Diäthylamin gibt es nur mit Mühe Amid und Diäthylmalonamidsäure. Über den Schmelzpunkt erhitzt destilliert es unter geringer Zersetzung über.

Es war also von der größten Wichtigkeit, die Molekulargröße der zwei Anhydride kennen zu lernen. Krioskopische Bestimmungen lieferten überraschende Resultate. Die kristallisierte Modifikation (Schm. 220°) gab nur einen Wert $(\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_3)_4$ (Ber. 568 gef. 569,4 und 541,5). Sie ist also tetramolekular. Seiner Beständigkeit zufolge kann dieses Anhydrid als ringförmig angenommen werden. Seine Strukturformel wäre folgende:

1) Vergl. D.R.P. 127889.



Das amorphe bei 85° schmelzende Anhydrid gab in Benzol den Wert (C₇H₁₀O₃)₁₂ (Ber. 1704 gef. 1771 und 1740) in Äthylenbromid ebenfalls (C₇H₁₀O₃)₁₂ (Ber. 1704 gef. 1769); in Nitrobenzol aber bekam ich den Wert (C₇H₁₀O₃)₈ (Ber. 1136 gef. 1162 und 1139).

Er zeigt sich also dodeka- und oktomolekular.

Ein ähnliches Verhalten zeigt auch Indigo. Nach den Versuchen von Vaubel¹⁾ und von Beckman und Gabel²⁾ verursacht Indigo in Anilin und Phenol eine Erniedrigung des Gefrierpunktes, an der sich eine monomolekulare Formel berechnen läßt. In Paratoluidin aber zeigt sich Indigo dimolekular. Bei der Bestimmung der Siedepunkterhöhung in diesen Lösungsmitteln auch in Paratoluidin ergeben sich Werte, welche alle den Indigo monomolekular erscheinen lassen.

Auch die Temperatur der Lösung kann von Einfluß auf die Molekulargröße sein.

So gibt z. B. das von Piloty³⁾ dargestellte Dimethyl-2,5-nitroso-2-hexan (CH₃)₂=C(NO)—CH₂—CH₂—CH=(CH₃)₂ in Benzol das doppelte Molekulargewicht, wenn man es bei niedriger Temperatur gelöst hat, wobei seine Lösung farblos ist. Hat man aber das Benzol beim Lösen etwas erwärmt, so ist die Lösung blau gefärbt und die Gefrierpunkterniedrigung entspricht dem einfachen Molekulargewichte.

1) Ber. 39, 3588 [1906]; Ch. Zeitung II 25, 725 [1901].

2) Ber. 39, 2611 [1906].

3) Ber. 31, 456 [1898].

Daraus muß, nach Piloty, der Schluß gezogen werden, daß diese Verbindung im festen Zustande dimolekular ist und daß der Übergang aus dem festen weißen in den flüssigen blauen bei Temperaturerhöhung von einer Dissociationserscheinung begleitet ist.

Wenn sich auch für die Bestimmung der Konstitution dieses Anhydrides sichere Anhaltspunkte nicht in genügender Menge vorfinden, so steht doch nach seinen chemischen Eigenschaften folgendes fest:


1. Es liegt eine Verbindung vor, welche einmal oder mehrere Male die Gruppe CO—O—CO enthält, welche je zwei mit Äthylgruppen beladene Kohlenstoffatome verbindet.

2. Es existiert jedoch keine freie Diäthyleessigsäuregruppe, da die Verseifung nur Diäthylmalonsäure liefert.

Das aus acht und zwölf Molekülen bestehende Anhydrid stellt das Doppelte und Dreifache des tetramolekularen Komplexes dar. Man kann daher annehmen, daß sie aus zwei bzw. drei locker miteinander verbundenen Komplexen $(\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_3)_4$ entstanden sind, aber leicht wieder zerfallen in das beständigere vierfache unter teilweiser Zersetzung.

Es fragt sich nun: Wie könnten diese tetramolekularen Gruppen zu zweien oder zu dreien miteinander verbunden sein?


Vielleicht liefse sich diese Anhydridbildung nach der Theorie der Partialvalenzen von Thiele¹⁾ erklären. Nach dieser Theorie ist in jeder Doppelbindung die Affinitätskraft nicht als völlig von der doppelten Bindung verbraucht anzusehen, sondern es bleibt an jedem Atom ein Affinitätsrest, Partialvalenz genannt, übrig.



Diese Theorie hat so viel Anwendungen gefunden, daß sie als hinreichend bekannt vorausgesetzt werden darf und nicht weiter ausgeführt zu werden braucht.

Wenn wir das tetramolekulare Anhydrid ins Auge fassen, so sehen wir, daß in demselben CO -Gruppen enthalten sind, die man sich in Anwendung der Thieleschen Theorie wohl folgendermaßen gebunden denken kann:

1) Ann. 306, 87 [1899].



Wie auch die Bindung zwischen den Komplexen beschaffen sein mag, jedenfalls ist sie eine ziemlich lockere, nachdem sie von dem Lösungsmittel so stark beeinflusst wird.

Es sei noch hier bemerkt, daß auf ähnliche Weise auch andererseits mehrfach molekulare Anhydride gefunden wurden:

Richard B. Earle und H. Louis Jackson¹⁾ erhielten aus 3-5-Dichlorsalicylchlorid unter Anwendung von Pyridin in siedendem Chloroform ein inneres Anhydrid von der Formel $(C_6H_2Cl_2OCO)_4$, das bei 330° schmolz und sehr langsam verseifbar ist [Ähnlichkeit mit $(C_7H_{10}O_3)_4$].

3-5-Dibromsalicylsäure gab mit Pyridin in Acetonlösung bei -10° ein Heptasalicyd $(C_6H_2Br_2OCO)_7$. Doch ist zweifelhaft, ob die erhaltene Verbindung einheitlich ist, da sie zwischen 123° und 223° schmilzt und durch Lösungsmittel verändert wird. [Ähnlichkeit mit $(C_7H_{10}O_3)_{12}$].

Dimethylmalonylchlorid verhält sich wie Diäthylmalonylchlorid: es gibt mit verdünnter Pyridinlösung ebenfalls ein weißes Pulver, das bei $145-148^\circ$ unter Zersetzung schmilzt. Wir sehen hier wieder den Einfluß der Substituenten. Hier bildet wieder Dimethylmalonsäurechlorid einen Übergang: Es bildet ein Anhydrid, das gleichfalls ein dodekamolekulares Polymeres ist. Dieses Anhydrid ist aber nicht imstande, in ein vierfaches Polymeres überzugehen; beim Erwärmen in indifferenten Lösungsmitteln entsteht etwas Dimethylelessigsäureanhydrid und Dimethylmalonsäure. Gegen Wasser ist es viel empfindlicher und wird leicht verseift, mit Ammoniak bildet es wohl Dimethylmalonamid, aber keine Dimethylmalonamidsäure.

Der Einfluß der beiden an C gebundenen Methylgruppen auf das Molekül ist also nicht so groß, daß dadurch die Verseifung in dem Maße verzögert würde wie durch zwei Äthylgruppen.


1) Centr.-Bl. 1906 I 929.

Experimenteller Teil.

I. Einwirkung von Amalgamen auf Thiobarbitursäure und ihre Homologen.

Die zu den folgenden Versuchen verwendete Thiobarbitursäure wurde nach dem Verfahren von Michael¹⁾ gewonnen: Man bringt eine heisse alkoholische Lösung von Sulfoharnstoff zu alkoholischem Natriummalonester, filtriert das entstandene Natriumsalz der Thiobarbitursäure ab, setzt mit HCl die Säure in Freiheit und kristallisiert aus Wasser um. Die Diäthylthiobarbitursäure wurde mir von den Farbwerken vorm. Meisler Lucius und Brüning in Höchst dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. Die anderen noch unbekannten Säuren, nämlich die Monoäthyl-, Dimethyl- und Dipropylthiobarbitursäure, stellte ich selber dar. Die beiden letztgenannten Verbindungen wurden kurze Zeit darauf in einem Deutschen Reichs-Patent beschrieben.

Monoäthylthiobarbitursäure.



3 g Monoäthylmalonester werden im Rundkolben mit einer Lösung von 1,2 g Natrium in 40 g absolutem Alkohol vermischt, wodurch ein weißer Niederschlag des Natriumsalzes des Esters entsteht. Die Flüssigkeit wird auf dem Wasserbade erwärmt und 1,6 g trockener gepulverter Thioharnstoff hinzugefügt; man hält die Temperatur vier Stunden lang auf 80°, destilliert dann den größten Teil des Alkohols

1) Journ. pr. Ch. [2] 35, 456 [1887].

ab und läßt erkalten; nach dem Verdünnen mit Wasser, wobei klare Lösung entsteht, säuert man mit HCl an. Die Monoäthylthiobarbitursäure fällt als rosa gefärbte Masse aus. Durch zweimaliges Umkristallisieren aus Alkohol und Kochen mit Tierkohle erhält man die Säure in Form von schwach gelb gefärbten Nadeln (Sin. 192° uncorr.). Dieser Körper ist unlöslich in kaltem Wasser, mehr in warmem, leicht in siedendem Spirit. Alkalien lösen ihn leicht, Säuren fällen ihn aber aus dieser Lösung. Die Ausbeute bei dieser Darstellung beträgt 43,6 % der Theorie.

Analysen: I. 0,1960 g Subst. gaben 0,3015 g CO₂ und 0,0830 g H₂O.

II. 0,1520 g Subst. gaben 22,2 cm³ N bei 14° und 721 mm.

III. 0,3205 g Subst. gaben 0,4376 g SO₄Ba.

Ber. auf C₆H₈O₂N₂S:

Gefunden:

C 41,86 %

41,95 %

H 4,65 %

4,70 %


N 16,28 %

16,30 %

S 18,60 %

18,75 %

Dimethylthiobarbitursäure.



1,2 g Natrium werden in 40 g absolutem Alkohol gelöst, 3 g Dimethylmalonester hinzugefügt und auf dem Wasserbade erwärmt. Siedet die Flüssigkeit, so werden 1,6 g fein gepulverter Thioharnstoff zugesetzt. Nach sechsstündigem Kochen am Rückflusskühler wird der Alkohol abdestilliert, der Rückstand in Wasser gelöst und die Säure aus dieser alkalischen Lösung mit HCl ausgefällt. Die Dimethylthiobarbitursäure bildet aus Alkohol umkristallisiert gelbliche Nadeln, die bei 216° schmelzen. Ihre Eigenschaften sind dieselben wie die der Monoäthylthiobarbitursäure (Ausbeute 56 % der Theorie).

Analysen: I. 0,2130 g Subst. gaben 0,3285 g CO₂ und 0,0910 g H₂O.

II. 0,2095 g Subst. gaben 30,7 cm³ N bei 14° und 721 mm.

III. 0,3155 g Subst. gaben 0,4329 g SO₄Ba.

Ber. auf C₆H₈O₂N₂S:

Gefunden;

C 41,86 %

42,07 %

H 4,65 %


4,75 %

N 16,28 %

16,40 %

S 18,60 %

18,83 %

Dipropylthiobarbitursäure.

Eine Lösung von 1,71 g Natrium in 33 g absolutem Alkohol wird mit 6 g Dipropylmalonester vermischt, auf dem Wasserbade erwärmt und 2,3 g fein gepulverter Thioharnstoff hinzugefügt. Nach fünf-stündigem Erhitzen wird das Reaktionsprodukt wie die Monoäthylthio-barbitursäure isoliert. Die Dipropylthiobarbitursäure bildet gelbe Na-deln vom Schmelzpunkt 154°. Die Ausbeute beträgt 30% der Theorie. Ihre Eigenschaften gleichen denen ihrer Homologen.

Analysen: I. 0,2120 g Subst. gaben 0,4087 g CO₂ und 0,1373 g H₂O.

II. 0,2035 g Subst. gaben 22,6 cm³ N bei 14° und 721 mm.

III. 0,3210 g Subst. gaben 0,3332 g SO₄Ba.

Ber. auf C ₁₀ H ₁₆ O ₂ N ₂ S:	Gefunden:
C 52,63 %	52,45 %
H 7,01 %	7,20 %
N 12,28 %	12,40 %
S 14,03 %	14,25 %

Reduktion der Thiobarbitursäuren.**1. Thiobarbitursäure.**

3 g Thiobarbitursäure wurden in 100 ccm Wasser suspendiert und unter Kühlung auf 0° nach und nach 80 g Natriumamalgam (3 %) zugesetzt. Es entwich sehr wenig H₂S, während die Thiobarbitursäure sich ziemlich schnell auflöste. Man liefs die Mischung nun zwei Tage stehen; die Flüssigkeit bleibt immer klar. Beim Ansäuern mit Salz-säure der vom Quecksilber getrennten Lösung fiel die Thiobarbitur-säure zur Hälfte unverändert aus. Beim Eindampfen der mit Natrium-acetat essigsauer gemachten Lösung blieben ölige Produkte, die keine charakterisierbare Endprodukte enthielten. Malonamid und Malonsäure waren in diesem Rückstande nicht zu finden. Ein zweiter bei 60° angestellter Versuch ergab dasselbe Resultat.

2. Monoäthylthiobarbitursäure.

3 g Monoäthylthiobarbitursäure, in 100 ccm Wasser suspendiert, wurden bei 0° allmählich mit 160 g Natriumamalgam versetzt. Die Säure ging dabei in Lösung. Nach eintägigem Stehen wurde die klare Flüssigkeit angesäuert (HCl). Es fielen 1,75 g Monoäthylthio-

sich ein weißer kristallinischer Körper ab. Es ist zweckmässig die Flüssigkeit von Zeit zu Zeit mit etwas HCl zu neutralisieren. Ist das Amalgam verbraucht, was drei Tage in Anspruch nimmt, so dekantiert man von dem Quecksilber und filtriert die ausgeschiedenen Kriställchen ab, welche aus heissem Wasser umkristallisiert werden können. Das Produkt erwies sich als Diäthylmalonamid vom Schmelzpunkt 220° unc. (Fischer 224° corr.). Das Filtrat wird nun mit HCl angesäuert. Es scheidet sich eine dicke weiße Masse ab, die abgesaugt und mit Wasser gewaschen wird. Das unten näher zu beschreibende Produkt ist Bis-diäthylmalonyläthantetramin vom Schmelzpunkt 340° (ca. 12 g).


Die wässrige Flüssigkeit wird mit Natriumacetat essigsauer gemacht und zur Trockne verdampft. Der Rückstand wird durch 2—3stündiges Kochen mit absolutem Alkohol im Soxhlet extrahiert. Destilliert man nun den Alkohol ab, so hinterbleibt ein Gemenge von verschiedenen Produkten. Zur Trennung schüttelt man dasselbe mit etwas Ather, wodurch eine geringe Menge Diäthylmalonsäure in Lösung geht (ca. 2 g).

Dann löst man den Rückstand in kaltem Wasser; etwas Diäthylmalonamid bleibt zurück (ca. 2 g). Die ganze Ausbeute an Amid beträgt 50 g.

Das wässrige Filtrat wird dann mit einer concentrirten Lösung von 30—35 g Quecksilberchlorid in wenig Wasser vermischt. Nach 3—4 Tagen haben sich 38,5 g eines Doppelsalzes abgeschieden. Dieses Salz wird, in Wasser suspendiert, durch Einleiten von Schwefelwasserstoff zerlegt. Die vom Quecksilbersulfid filtrirte Flüssigkeit wird zur Trockne verdampft. Der Rückstand wurde aus wenig Alkohol umkristallisiert und erwies sich als Diäthylmalonylmethylen-diamin vom Schmelzpunkt 293° , welches unten näher besprochen wird (ca. 15 g).

Bis-diäthylmalonyläthantetramin.

Sm. 340° .



Zur Reinigung wird das Rohprodukt aus wasserhaltigem Alkohol umkristallisiert. Es bildet kleine weiße Prismen vom Schmelzpunkt 340° . Der Körper ist löslich in warmem absolutem Alkohol und in kaltem Eisessig, sonst unlöslich.

Beim Trocknen über 110° verliert der Körper sein Kristallwasser (2 Moleküle). Die wasserfreie Verbindung ist auch in kochendem Alkohol unlöslich. In warmer rauchender Salpetersäure löst sie sich unverändert auf, in anderen Lösungsmitteln ist sie so gut wie unlöslich. Die Substanz löst sich jedoch in Soda und Natronlauge und wird durch Säuren wieder abgeschieden. Die wasserfreie Form geht leicht in die wasserhaltige über, wenn man sie mit Alkohol kocht und ein paar Tropfen Wasser zusetzt. Sie löst sich dann augenblicklich und scheidet sich beim Erkalten in glänzenden Prismen mit 2 Mol. Wasser aus, welche der Körper im Exsikkator nicht verliert. Salpetersäure und das Beckmann'sche Reagens oxydieren ihn beim Kochen nicht. Bittermandelöl greift ihn auch nicht an, selbst unter Anwendung von Chlorzink als Kondensationsmittel und bei längerem Erwärmen.

Analysen: Der Körper wurde über 110° getrocknet. Kristallwasserbestimmung: 1,0047 g Subst. verloren 0,0978 g H_2O .

Berechnet auf $C_{16}H_{26}O_4N_4 + 2H_2O$:	Gefunden:
9,62 % H_2O	9,73 %

- I. 0,2015 g Subst. gaben 0,4176 g CO_2 und 0,1432 g H_2O .
 II. 0,2686 g Subst. gaben 0,5623 g CO_2 und 0,1880 g H_2O .
 III. 0,2108 g Subst. gaben 32,4 ccm N bei 19° und 714 mm.

Ber. auf $C_{16}H_{26}O_4N_4$:	Gefunden:
C 56,80 %	56,52 % 57,09 %
H 7,69 %	7,89 % 7,77 %
N 16,56 %	16,57 %

Aus der Berechnung auf die einfache Formel $C_8H_{14}O_2N_2$ sieht man, daß meine Werte außerhalb der Fehlergrenze liegen würden. $C = 56,47\%$ $H = 8,23\%$.

Analysen der kristallwasserhaltigen Verbindung:

- I. 0,2106 g Subst. gaben 0,3955 g CO_2 und 0,1557 g H_2O .
 II. 0,2505 g Subst. gaben 0,4728 g CO_2 und 0,1866 g H_2O .

Ber. auf $C_{16}H_{26}O_4N_4 + 2H_2O$:	Gefunden:
C 51,33 %	51,22 % 51,43 %
H 8,02 %	8,16 % 8,23 %

Für die Formel $C_8H_{14}O_2N_2 + H_2O$ $C = 51,06$ $H = 8,51$ sind zwei Werte außerhalb der Fehlergrenze.

Molekulargewichtsbestimmungen (kristallwasserhaltige Verb.).

I. 0,3080 g Subst. in 27 g Eisessig gelöst gaben eine Erniedrigung des Gefrierpunktes von 0,250°.

$$M = \frac{39 \times 1,1407}{0,250} = 177.$$

Ber. auf $C_8H_{14}O_2N_2 + H_2O = 188$ Gef.: 177

„ „ $C_{16}H_{26}O_4N_4 + 2H_2O = 374$ „ 354 (bei Dissociation).

II. 0,3586 g Subst. in 44 g abs. Alkohol gaben eine Erhöhung des Siedepunktes von 0,0484°.


$$M = \frac{11,5 \times 0,8141}{0,0484} = 197.$$

Ber. auf $C_8H_{12}O_2N_2 + H_2O = 188$ Gef.: 197

„ „ $C_{16}H_{26}O_4N_4 + 2H_2O = 374$ „ 394 (bei Dissociation).

Der stark saure Charakter der Verbindungen und die Anwesenheit von Kristallwasser macht die doppelte Formel ebenso wahrscheinlich als die einfache. Auch die durch die Elementaranalysen erhaltenen Werte stimmen besser auf die doppelte Formel $C_{16}H_{26}O_4N_4 + 2H_2O$.

Diäthylmalonylmethyldiamin.



Das aus dem Quecksilberdoppelsalze isolierte (s. oben) Produkt wird aus wenig Alkohol umkristallisiert. Es kristallisiert in glänzenden, stark lichtbrechenden Pyramiden vom Schmelzpunkt 293°.

Die Verbindung ist leicht löslich in Wasser und kochendem Alkohol, unlöslich in Äther und Benzol. Mit $HgCl_2$ bildet sie ein Doppelsalz $C_{18}H_{14}O_2N_2 + HgCl_2$, schöne lange Nadeln vom Schmelzpunkt 215—218°, die aus warmem Wasser umkristallisiert werden können. Löst man das Diamid in warmer concentrirter Salzsäure oder Salpetersäure, so scheiden sich beim Erkalten grofse Tafeln ab, die ohne Zweifel salzsaures und salpetersaures Salz darstellen. Diese Salze verlieren aber ihre Säure schon beim Verdünnen der Mutterlauge mit Wasser oder wenn man sie im Vakuum trocknen will.

Gegen Salpetersäure oder Chromsäuremischung ist das Diamin beständig, sogar beim längeren Kochen. Bittermandelöl, sei es für sich, sei es beim Erwärmen mit $ZnCl_2$ tritt nicht in Reaktion mit dem Diäthylmalonylmethyldiamin.

Analysen: I. 0,2088 g Subst. gaben 0,4315 g CO₂ und 0,1583 g H₂O.
 II. 0,2101 g Subst. gaben 0,4352 g CO₂ und 0,1556 g H₂O.
 III. 0,2030 g Subst. gaben 30,9 cm³ N bei 14° und 706 mm.

Berechnet auf C₈H₁₄O₂N₂:

Gefunden:

C	56,47 %	56,36 %	56,49 %
H	8,23 %	8,42 %	8,23 %
N	16,47 %	16,61 %	

Molekulargewichtsbestimmung (kryoskopische Methode).

0,9983 g Subst. in 50 g Wasser gaben eine Erniedrigung des Gefrierpunktes von 0,227°.

$$M = \frac{19 \times 1,9966}{0,227} = 167,1. \quad \text{Ber. auf C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2 = 170.$$

Quecksilberbestimmung des Doppelsalzes: 0,2344 g Subst. gaben 0,1229 g HgS.

Ber. auf C₈H₁₄O₂N₂ + HgCl₂:

Gefunden:

Hg	45,35 %	45,20 %
----	---------	---------

5. Dipropylthiobarbitursäure.

3 g dieser Säure werden in 50 ccm Wasser suspendiert und bei Zimmertemperatur mit 61 g Amalgam behandelt, wodurch die Substanz unter Entwicklung von H₂S in Lösung geht. Es scheidet sich nach und nach ein kristallinischer Körper aus. Von Zeit zu Zeit neutralisiert man mit HCl. Nach einem Tage dekantiert man von dem Quecksilber und filtriert die ausgeschiedenen Kriställchen, die nach dem Umkristallisieren aus Wasser bei 210° schmelzen (Fischer 214° corr.) und sich als Dipropylmalonamid erweisen (ca. 1,5 g).

Das noch alkalische Filtrat wird dann mit HCl angesäuert; es fällt 0,1 g eines schwefelfreien Produktes aus, das nicht weiter untersucht wurde, wahrscheinlich ein analoges Produkt wie bei der Diäthylthiobarbitursäure. Nach dem Abfiltrieren wird die Flüssigkeit mit Natriumacetat essigsauer gemacht und zur Trockne verdampft. Der Rückstand wird mit Alkohol kurze Zeit extrahiert, um den Rest des Amids noch zu gewinnen. Zwar enthält die alkoholische Lösung nach dem Extrahieren 0,1 g Amid und einen zweiten neutralen nicht weiter untersuchten Körper. Die Ausbeute an Dipropylmalonamid beträgt 1,6 g, also 66 % der Theorie.

6. Reduktionsversuche mit Diäthylthiobarbitursäure und anderen Amalgamen.

Ammoniumamalgam: Die Reduktion der Diäthylthiobarbitursäure mit Ammoniumamalgam wurde versucht um zu sehen, ob nicht die bei der Anwendung von Natriumamalgam entstehende Natronlauge eine Verseifung des gebildeten Amids verursacht, welche durch Benützung von Ammoniumamalgam eventuell verhindert werden konnte. Ich bekam jedoch dieselbe Ausbeute.

3 g Diäthylthiobarbitursäure wurden in einer Lösung von 5 g NH_4Cl in 100 g Wasser suspendiert und 90 g Natriumamalgam in kleinen Portionen hinzugefügt. Das Amalgam wird sofort voluminös unter Bildung von Ammoniumamalgam, es entweicht auch H_2S und die Säure löst sich auf. Ist die Reaktion beendet, so verarbeitet man das Produkt auf die gleiche Weise wie für die Reduktion mit Natriumamalgam angegeben wurde. Die Ausbeute an Diäthylmalonamid beträgt 1,5 g = 63 % Theorie.

Calciumamalgam. Dieses Amalgam reagiert träge und schlecht. Seit neuerer Zeit ist Calcium ziemlich billig geworden und es wurde öfters versucht, sein Amalgam an Stelle desjenigen des Natriums zu verwenden; jedoch zeigt es sich lange nicht so reaktionsfähig. 150 g Quecksilber werden auf dem Sandbade in einem Erlenmeyerkolben gelinde erwärmt und dann in kleinen Portionen 2 g met. Calcium eingetragen, das sich bald löst. Beim Erkalten wird das Amalgam fest. Man gießt dazu eine Lösung von Diäthylthiobarbitursäure in 100 g Kalkwasser. Die Flüssigkeit wird trübe und es entweicht wenig H_2S ; vor vier oder fünf Tagen ist die Reaktion nicht beendet. Man säuert dann vorsichtig mit Salzsäure an und filtriert den ungelöst gebliebenen Niederschlag ab, ein Gemisch von Diäthylmalonamid und Bis-diäthylmalonyläthantetramin. Das Filtrat wird mit NaCl versetzt und scharf ausgeäthert. Nach neunmaligem Ausäthern bekommt man 1,2 g eines Körpers, der bei 120° schmilzt und sich als Diäthylmalonsäure erwies. Die Mutterlaugen weiter zu bearbeiten hat keinen Zweck.

Das Gemenge von Diäthylmalonamid und Bis-diäthylmalonyltetramin wird mit Natronlauge digeriert, wobei das letztere sich löst; das zurückbleibende Diäthylmalonamid wird aus Wasser umkristallisiert; die Ausbeute beträgt 0,2 g = 10 % der Theorie.

Magnesiumamalgam. Das Amalgam wurde durch Erwärmen von Magnesiumpulver und Quecksilber im hessischen Tiegel dargestellt; man bereitet am besten ein Amalgam von 2 %.

3 g Diäthylthiobarbitursäure wurden in der berechneten Menge Natriumcarbonat gelöst und zu der mit 100 ccm Wasser verdünnten Lösung 195 g Amalgam (das Fünffache der Theorie) in kleinen Portionen hinzugefügt. Nach dreitägigem Stehen, unter zeitweiser Abstumpfung mit HCl, wurde die Flüssigkeit angesäuert und von dem ungelösten Gemisch von Diäthylmalonamid und Bis-diäthylmalonyläthantetramin abfiltriert. Im Filtrat wurde dann das Magnesium mit Natronlauge gefällt, abgesaugt, die Flüssigkeit essigsauer gemacht und zur Trockne verdampft. Der Rückstand wurde mit absolutem Alkohol extrahiert, welcher beim Verdampfen noch etwas Amid hinterläßt. Die zwei Portionen, die Amid enthalten, werden mit Natronlauge behandelt, welche das Bis-diäthylmalonyltetramin löst. Das zurückbleibende Diäthylmalonamid wird aus warmem Wasser umkristallisiert. Die Ausbeute betrug 1,1 g, d. h. 46,7 % der Theorie.

Amalgamiertes Aluminium. Dieses wurde auf zweierlei Art dargestellt:

1. Aluminiumspäne werden direkt mit wässriger Quecksilberchloridlösung geschüttelt und sofort verwendet;
2. Aluminiumspäne werden mit ätherischem Quecksilberchlorid übergossen, diese Lösung abgegossen und mit einer verdünnten NaOH-Lösung versetzt, dann wieder mit der Quecksilbersalzlösung behandelt und dieser Prozeß fünf- bis sechsmal wiederholt.

3 g Diäthylthiobarbitursäure werden in der entsprechenden Menge Soda gelöst, mit 2 g amalgamiertem Aluminium behandelt und drei Tage stehen gelassen. Es scheidet sich ein voluminöser Niederschlag von Aluminiumhydroxyd ab, es entweicht aber wenig H_2S . Dieser Niederschlag wird scharf abgesaugt, mit Alkohol und Äther gewaschen und mit absolutem Alkohol extrahiert. Das erhaltene alkalische Filtrat wird essigsauer gemacht, zur Trockne verdampft und ebenfalls mit absolutem Alkohol extrahiert. Die beiden alkoholischen Auszüge werden eingedunstet und der Rückstand zur Entfernung von etwas Bis-diäthylmalonyläthantetramin (0,1 g) mit Natronlauge digeriert. Es hinterbleiben 0,6 g Diäthylmalonamid, d. h. 25,3 % der Theorie.

Aus allen diesen Versuchen geht hervor, daß die Reaktion bei den disubstituierten Barbitursäuren immer in demselben Sinne erfolgt, nur die Ausbeuten der Reaktionsprodukte sind verschieden. Sie hängen


erstens ab von der Konstitution der Thiobarbitursäure, d. h. den CC-Alkylgruppen, zweitens von dem verwendeten Amalgame.

Folgende Tabelle macht das ersichtlich:

Übersicht der Versuche.

Thiobarbitursäure	Grammenge	Lösungs- mittel	Temperatur	Dauer in Tagen	Amalgam	Diamid	Prozent an Amid	Unveränderte Thiobarbitur- säure	Bismalonyl- äthantetra- minderivat
Thiobarbitursäure .	3	H ₂ O	0°	2	Na 30/0	—	—	1,5	—
Monoäthyl- " .	3	H ₂ O	0°	1	Na 30/0	—	—	1,75	—
Dimethyl- " .	3	H ₂ O	15°	1	Na 30/0	0,2	10	1,3	—
Diäthyl- " .	100	H ₂ O	15°	3	Na 30/0	50	63,3	—	12
Dipropyl	3	H ₂ O	15°	1	Na 30/0	1,6	66	—	0,1
Diäthyl	3	NH ₃	15°	1	NH ₄	1,5	63,3	—	0,1
"	3	Ca(OH) ₂	15°	4	Ca	0,2	10	—	0,1
"	3	CO ₃ Na ₂	13°	3	Mg	1,1	46,7	—	0,1
"	3	"	15°	3	Al	0,6	25,3	—	0,1

Symmetrisches N-Dichloraldiäthylmalonamid.



1 g Diäthylmalonamid werden mit 2 g Chloral bei 96° zwei Stunden lang erwärmt. Dann wird die Temperatur bis 130—140° erhöht und wieder zwei Stunden auf dieser Temperatur gehalten. Das Reaktionsgemisch wird nach und nach fest. Man läßt dann erkalten, wäscht mit etwas kaltem Wasser, um etwas frei gebliebenes Chloral zu entfernen, und kristallisiert aus Sprit um. Das symmetrische N-Dichloraldiäthylmalonamid bildet ein weißes kristallinisches Pulver,


das in Wasser unlöslich ist, leichter aber in Alkohol. Es schmilzt bei 178° und zerfällt dabei in Chloral und Diäthylmalonamid.

Analyse: 0,2038 g Subst. gaben 0,3842 g AgCl.


Ber. ClAg = 46,88 % Cl. Gef.: 46,64 % Cl.

II. Einwirkung von Anilin und Phenylhydrazin auf Diäthylthiobarbitursäure.

Diäthylmalonylphenylguanidin.



10 g Diäthylthiobarbitursäure und 4,6 g Anilin werden im Ölbad erwärmt. Die Temperatur soll zwischen 120° und 130° gehalten werden. Es entweicht sofort H_2S und die zuerst flüssige rote Reaktionsmasse wird nach und nach fester. Man erhitzt weiter bis das Produkt ganz hart geworden ist und die H_2S -Entwicklung aufgehört hat, was 12–14 Stunden in Anspruch nimmt. Die erkaltete Schmelze wird dann mit wenig kaltem Alkohol gewaschen, um einige Verunreinigungen zu entfernen. Der ungelöste Rückstand wird scharf abgesaugt und in viel Alkohol zweimal umkristallisiert. Das Diäthylmalonylphenylguanidin bildet weiße glänzende Nadeln vom Schmelzpunkt 253° (uncorr.), die schwer in Äthylalkohol und Holzgeist in der Kälte löslich sind. Die Verbindung ist in verdünnter Natronlauge löslich, wird aber von Säuren aus dieser Lösung wieder gefällt. Beim Kochen mit Mineralsäuren spaltet sie ihre Anilingroupe ab und geht in Diäthylbarbitursäure über:



Analysen: 0,1844 g Subst. gaben 0,4406 g CO_2 und 0,1138 g H_2O .

0,1828 g Subst. gaben 26,8 ccm N bei 18° und 721 mm.

Ber. auf $\text{C}_{14}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}_3$:

C 64,86 %

H 6,56 %


N 16,21 %

Gefunden:


65,17 %

6,85 %

16,48 %

Diäthylmalonylphenylaminoguanidin.

10 g Diäthylthiobarbitursäure werden mit der molekularen Menge Phenylhydrazin sechs Stunden auf 120—130° erhitzt. Die flüssige Masse wird nach und nach fester und gibt fortwährend H₂S ab. Nach dem Erkalten wird die feste Schmelze durch Waschen mit Alkohol von den Verunreinigungen befreit und dann aus Alkohol umkristallisiert. Das Diäthylmalonylphenylaminoguanidin kristallisiert in schwach gelbsichtigen Nadeln oder Blättchen (aus Holzgeist) und schmilzt bei 215°. Es bildet mit Natronlauge ein blaues in Alkohol unlösliches Salz, das sich in wenig Wasser mit blauer, in viel Wasser mit roter Farbe löst; mit der Zeit trübt sich diese Lösung. Diäthylmalonylphenylaminoguanidin erleidet beim Kochen mit Säuren ebenfalls eine Spaltung in Diäthylbarbitursäure und Phenylhydrazin:



Analysen: 0,2263 g Subst. gaben 0,5092 g CO₂ und 0,1393 g H₂O.

0,1922 g Subst. gaben 37,4 ccm N bei 23° und 716 mm.

Ber. auf C₁₄H₁₈O₂N₄:

Gefunden:

C 61,31 %

61,10 %

H 6,57 %


6,31 %

N 20,40 %

20,62 %

III. Über Diureide der Diäthylmalonsäure.

Symmetrisches Tetramethyldiureid der Diäthylmalonsäure.



Der as-Dimethylharnstoff wurde nach dem Verfahren von Franchimont¹⁾ durch Mischung einer Lösung von Kaliumcyanat

1) Rec. des trav. chim. des pays bas [2] 122, [3] 222 [1883—1884].

mit schwefelsaurem Dimethylamin und Ausäthern des Reaktionsproduktes dargestellt.

2 g as-Dimethylharnstoff wurden mit 2,5 g Diäthylmalonylchlorid gemischt und zwei Stunden auf 100° erwärmt. Die flüssige Reaktionsmasse entwickelt Salzsäure. Man erwärmt dann zwei weitere Stunden auf 120—130°. Wenn keine Salzsäure mehr entweicht, läßt man abkühlen, worauf die Masse erstarrt. Man behandelt sie dann mit wenig kaltem Wasser, um etwas unveränderten Dimethylharnstoff zu entfernen, saugt ab und kristallisiert aus Wasser um. Die Ausbeute beträgt 2,52 g (70 % der Theorie).

Man kann den Körper auch darstellen, indem man den Harnstoff in Pyridin suspendiert, mit der berechneten Menge Diäthylmalonylchlorid unter Kühlung versetzt und das flüssige Gemisch auf dem Wasserbad drei Stunden erwärmt. Man verdünnt dann mit Wasser, das überschüssige Pyridin wird mit Wasserdampf verjagt und die Flüssigkeit mit Salzsäure angesäuert. Das Dimethyldiureid fällt beim Erkalten aus. Die Ausbeute ist aber geringer (55 % der Theorie). Der Körper kristallisiert aus warmem Wasser in kleinen glänzenden rhombischen Kristallen und schmilzt bei 158° (uncorr.) Er ist sehr schwer löslich in kaltem Wasser, leichter in Alkohol, noch leichter in kochendem Wasser oder Alkohol, leicht in Äther; er löst sich auch in Natronlauge und wird von Säuren wieder ausgefällt.

Analysen: 0,2624 g Subst. gaben 0,5000 g CO₂ und 0,1894 g H₂O.

0,2100 g Subst. gaben 36,1 ccm N bei 16° und 714 mm.

Ber. auf C₁₃H₂₄O₄N₄:

C 52,00 %

H 8,00 %

N 18,66 %


Gefunden:

52,00 %


8,02 %

18,89 %

0,5 g des Produktes wurden in wenig concentrirter SO₄H₂ gelöst und dann 2 g rauchende Schwefelsäure hinzugegossen. Das Gemisch erwärmt sich und es tritt CO₂-Entwicklung auf. Man erwärmt dann 2—3 Stunden auf dem Wasserbade, läßt erkalten und gießt die Lösung auf Eis. Es scheidet sich Diäthylbarbitursäure aus in einer Ausbeute von 0,3 g, d. h. 98 % der Theorie. Das Nebenprodukt der Reaktion, wahrscheinlich schwefelsaures Dimethylamin, wurde nicht untersucht. Der Vorgang ist folgender:



Symmetrisches Tetraäthylidiureid der Diäthylmalonsäure.



15 g Diäthylmalonylchlorid werden mit 18 g as-Diäthylharnstoff, der nach demselben Verfahren wie Dimethylharnstoff bereitet war¹⁾, gemischt und die entstandene Flüssigkeit zuerst auf 100° erwärmt. Nach einer Stunde steigert man die Temperatur bis auf 120—130° bis keine Salzsäure mehr entweicht, was fünf oder sechs Stunden erfordert. Die tiefrote Flüssigkeit wird beim Erkalten fest. Man extrahiert nun mit warmem Äther, wobei sich das Reaktionsprodukt fast vollständig löst. Der Äther wird abdestilliert und die erkaltete feste Masse aus wenig 70proz. Alkohol umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt 12 g, d. h. 44,4% der Theorie.

Die Verbindung bildet kleine weißse Nadeln vom Schmelzpunkt 125°. Sie ist in Wasser unlöslich, ziemlich leicht in kochendem Alkohol, leicht in Äther; sie löst sich ferner in Alkalien, von Säuren wird sie wieder ausgeschieden. Bei zweistündigem Erwärmen auf dem Wasserbade mit dem zweifachen Gewicht rauchender Schwefelsäure geht das Diureid quantitativ in Diäthylbarbitursäure über.

Analysen: 0,2432 g Subst. gaben 0,5137 g CO₂ und 0,2000 g H₂O.
0,2035 g Subst. gaben 29,3 ccm N bei 18° und 720 mm.

Ber. auf C₁₇H₃₂O₄N₄:


C 57,30 %
H 8,98 %
N 15,73 %

Gefunden:

57,60 %
9,13 %
15,74 %

1) loc. cit.

Symmetrisches Diphenylmethyldiureid der Diäthylmalonsäure.



Der as-Phenylmethylnharnstoff wurde nach Gebhardt¹⁾ durch Mischung von Kaliumcyanat und salzsaurem oder schwefelsaurem Methylanilin erhalten. 2 g as-Phenylmethylnharnstoff wurden mit 1,3 g Diäthylmalonylchlorid gemischt und auf 100° erhitzt. Aus dem flüssigen Gemisch entwickelt sich Salzsäure. Die Masse wird allmählich fest. Nach einer Stunde erhöht man die Temperatur auf 110—120°. Wenn keine HCl mehr entweicht, läßt man die Masse erkalten, digeriert sie mit wenig kaltem Wasser, saugt sie scharf ab und kristallisiert sie aus Alkohol um. Die Ausbeute beträgt 36 % der Theorie.

Das symmetrische Diphenylmethyldiureid der Diäthylmalonsäure bildet weiße Nadeln, die bei 172° (uncorr.) schmelzen. Sie sind schwer löslich in kaltem und in heißem Wasser, leicht aber in warmem verdünnten Alkohol oder in Äther. Es löst sich leicht in Natronlauge. Beim Ansäuern fällt das Diureid unverändert aus.

0,8 g des Körpers wurden in sehr wenig conc. SO₄H₂ gelöst, 2 g rauchende SO₄H₂ zugesetzt und ein paar Stunden auf dem Wasserbade erwärmt. Die Flüssigkeit wird auf Eis gegossen, es scheidet sich dann Diäthylbarbitursäure in quantitativer Ausbeute aus (0,35 g).

Analysen: 0,2440 g Subst. gaben 0,5790 g CO₂ und 0,1400 g H₂O.

0,2343 g Subst. gaben 29,0 ccm N bei 19° und 720 mm.



Berechnet:	Gefunden:
C 65,09 %	64,72 %
H 6,63 %	6,37 %
N 13,30 %	13,20 %

Diäthylmalonylchlorid und Harnstoff in Pyridinlösung.


2 g Diäthylmalonylchlorid wurden langsam und unter Kühlung zu 0,6 g Harnstoff und 2 g Pyridin zugetropft. Nach einstündigem Stehen wurde die Flüssigkeit in der Kälte mit HCl angesäuert, mit Wasser verdünnt; es scheiden sich Kristalle ab, die abfiltriert werden. Das Produkt schmilzt aus warmem Wasser umkristallisiert bei 159° unter Verlust von CO₂ und Bildung von Diäthylacetylharnstoff. Es ist also

1) Ber. 17, 2095 [1884].

identisch mit der von Fischer und Dilthey¹⁾ dargestellten Diäthylmalonursäure (Sm. 161° corr.).




Bei einem zweiten Versuche wurden dieselben Mengen der Komponenten auf dem Wasserbade zwei Stunden lang erwärmt, das überschüssige Pyridin dann mit Wasserdampf verjagt und die Flüssigkeit angesäuert. Beim Erkalten schied sich ein Körper ab, der bei 188° (uncorr.) schmolz und alle Eigenschaften der Diäthylbarbitursäure besitzt; die Ausbeute beträgt 70% der Theorie.



Einwirkung von Schwefelsäure auf Diäthylmalonylcarbonyldiharnstoff.


Carbonyldiharnstoff²⁾ wurde durch Erhitzen von Harnstoff mit Phosgen, zwei Tage lang auf 100° in geschlossenem Rohr, dargestellt.




1) Ann. 335, 340 [1902].

2) Journ. für Pr. Ch. [2] 5 40 [1872].

Aus diesem Körper kann man Diäthylmalonylecarbonyldiharnstoff¹⁾ bekommen, indem man Diäthylmalonester und Carbonyldiharnstoff unter Einwirkung von Natriumäthylat 5—6 Stunden im geschlossenen Rohr erhitzt. Das Reaktionsprodukt wird in Wasser gelöst und scheidet sich beim Ansäuern der alkalischen Flüssigkeit ab.



Dieser Körper gab aber mit concentrirter und rauchender Schwefelsäure auf dem Wasserbade keine Diäthylbarbitursäure nach dem Schema:



IV. Einwirkung von wässerigem Pyridin auf Malonsäurechloride.

Hochmolekulares Diäthylmalonsäureanhydrid.



Zu einer Lösung von 8 g Natriumcarbonat in 100 ccm Wasser werden 3 g Pyridin hinzugegossen, die Lösung mit Eiswasser auf 0° gehalten und unter Umrühren mit der Turbine 10 g Diäthylmalonylchlorid im Laufe einer halben Stunde hinzugetropfelt. Die Anwesenheit von Soda erlaubt viel weniger Pyridin anzuwenden als notwendig wäre, um die ganze Salzsäure zu binden; das Pyridin wird fortwährend regeneriert und wirkt von neuem ein. Es scheidet sich während der Operation ein schwach rosa gefärbter Körper in Körnchen aus; man zerdrückt sie mit einem Glasstab und rührt noch einige Zeit um. Man filtriert das Produkt dann ab und wäscht es mit kaltem Wasser. Es wird in einer Reibschale mehrmals mit Natriumcarbonatlösung, Wasser, sehr verdünnter Salzsäure und zuletzt wieder mit Wasser behandelt, stark abgepresst und im Vakuum über Schwefelsäure und Stangenkali getrocknet. Man erhält 4,8 g des hochmolekularen An-

1) Vergl. D.R.P. C. 12 892 Kl. 12 p.

hydrids. Das Anhydrid schmilzt bei 80—85° unter Zersetzung und Verlust von Kohlensäure. Es ist sehr leicht löslich in Benzol und Pyridin, schwerer in Äther, Aceton, Essigester, Äthylenbromid, Essigsäureanhydrid, Nitrobenzol und Alkohol; vollständig unlöslich in Wasser.

Analysen: I. 0,2742 g Subst. gaben 0,1842 g H₂O und 0,5990 g CO₂.

II. 0,2256 g Subst. gaben 0,1464 g H₂O und 0,4864 g CO₂.

Ber. auf C₇H₁₀O₃:

C 59,15 %

H 7,03 %

Gefunden:

59,56 % 58,80 %

7,46 % 7,22 %

Molekulargewichtsbestimmung nach der kryoskopischen Methode:

a) In Benzol: 0,7848 g Subst. in 11,65 g Benzol gelöst gaben eine Erniedrigung von 0,190°. K = 49.

Ber. auf (C₇H₁₀O₃)₁₂ = 1704. Gef.: 1771.

0,3443 g Subst. in 10,2 g Benzol gaben eine Erniedrigung von 0,097°. K = 49.

Ber. (C₇H₁₀O₃)₁₂ = 1704. Gef.: 1740.

b) In Äthylenbromid: 0,5030 g Subst. wurden in 23,3 g Äthylenbromid gelöst K = 118 und gaben eine Erniedrigung von 0,144°.

Ber. (C₇H₁₀O₃)₁₂ = 1704. Gef.: 1769.

c) In Nitrobenzol: 0,4160 g Subst. in 10 g Nitrobenzol gaben eine Erniedrigung von 0,253°. K = 70,7.

Ber. auf (C₇H₁₀O₃)₈ = 1136. Gef.: 1162.

0,3544 g Subst. in 11 g Nitrobenzol gelöst gaben eine Erniedrigung von 0,200°. K = 70,7.

Ber. auf (C₇H₁₀O₃)₈ = 1136. Gef.: 1139.

Verseifung des Anhydrids: 1,5 g hochmolekulares Diäthylmalonsäureanhydrid wurden mit 1,6 g (3 Mol.) Kaliumhydroxyd in 10 ccm Wasser über Nacht stehen gelassen. Das Anhydrid löst sich schnell auf, die braune Flüssigkeit wurde dann angesäuert und ausgeäthert unter Zusatz von Kochsalz. Beim Eindunsten des Äthers hinterblieben 1,48 g einer bei 121° schmelzenden Säure, die sich als Diäthylmalonsäure erwies. Es findet hier aber keine Bildung von Diäthylelessigsäure statt. Die Ausbeute entspricht 87 % der Theorie. Concentrierte Schwefelsäure löst das Anhydrid ebenfalls. Gießt man die Lösung auf Eis, so bekommt man Diäthylmalonsäure auch in 87proz. Ausbeute.

Die Verseifung beweist, daß wir es nur mit Malonylgruppen zu tun haben. Da das hochmolekulare Anhydrid in den gewöhnlichen

Lösungsmitteln in der Kälte nicht verändert wird, so ist nicht eine Zersetzung die Ursache, daß es sich okto- oder dodekamolekular in verschiedenen Lösungsmitteln zeigen kann.

Einwirkung von Ammoniak auf das hochmolekulare Anhydrid.

Zu 5 g Anhydrid, die mit einer dünnen Schicht Wasser bedeckt sind, werden unter Kühlung $2\frac{1}{2}$ Mol. einer 14proz. Ammoniaklösung hinzuge tropft. Es tritt Wärmeentwicklung ein und das amorphe Anhydrid verwandelt sich in ein kristallinisches Pulver. Nach einigem Stehen, $\frac{1}{4}$ Stunde ungefähr, wird die Flüssigkeit von dem ungelösten Körper, der sich als Diäthylmalonamid erwies (1,7 g) abfiltriert; das Ammoniak wird im Vakuum entfernt, die Flüssigkeit mit Salzsäure angesäuert und unter Zusatz von Kochsalz 5mal ausgeäthert.

Beim Eindunsten des Äthers bleibt ein Öl zurück, das bald erstarrt. Ist das geschehen, so wäscht man es mit wenig Wasser und saugt es an der Pumpe scharf ab. Es ist Diäthylmalonamidsäure $\text{C}_2\text{H}_5 > \text{C} < \begin{matrix} \text{CONH}_2 \\ \text{COOH} \end{matrix}$ (1,75 g). Das Waschwasser hinterläßt beim Eindunsten Diäthylmalonsäure (1,8 g).

Die Diäthylmalonamidsäure bildet aus Wasser umkristallisiert glänzende Prismen, die bei 146° unter CO_2 -Entwicklung schmelzen. Sie geht dabei in Diäthylacetamid über. In derselben Zeit wurde sie von Conrad¹⁾ beschrieben, der sie durch Verseifung des Diäthylmalonaminesters darstellte.

Folgende Analysen dienten zur Identifizierung:

0,2231 g Subst. gaben 18 ccm N bei 16° und 716 mm.

0,2484 g Subst. gaben 0,4803 g CO_2 und 0,1821 g H_2O .

Ber. auf $\text{C}_7\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}$:

Gefunden:

C 52,83 %

52,73 %


H 8,17 %

8,15 %

N 8,80 %

8,85 %

Die Einwirkung von Ammoniak kann folgenderweise formuliert werden:



1) Ann. 340, 349 [1905].

Wasser entsteht bei der Bildung des Diamides und verseift die entsprechende Menge Anhydrid zu Diäthylmalonsäure.



Zwei andere Versuche, der eine mit der 1 Mol., der andere mit der 2 Mol. entsprechenden Menge verdünnten Ammoniaks auf 1 Mol. Anhydrid, wurden in der Hoffnung angestellt, nur die Diäthylmalonamidsäure zu bekommen. Es blieb aber dabei Anhydrid unverändert, das dem ausgeschiedenen Diäthylmalonamid beigemischt ist. Die Ausscheidung wurde filtriert und mit Benzol behandelt, in welchem sich das Anhydrid löst, nicht aber das Diäthylmalonamid. Das wässerige Filtrat wurde angesäuert und ausgeäthert; es enthielt auch ein Gemenge von Diäthylmalonamidsäure und Diäthylmalonsäure. Die Reaktion erfolgt in diesem Falle ganz wie die obige Gleichung es darstellt. Man braucht aber etwas mehr Ammoniak als es die Theorie erfordert (siehe Tabelle II und III).

5 g Diäthylmalonsäureanhydrid wurden nach und nach in concentrirter überschüssiger Ammoniaklösung bei 0° eingetragen. Das gebildete Amid wird abfiltriert (1,1 g), aus dem Filtrat Diäthylmalonamidsäure und Diäthylmalonsäure in ähnlicher Weise wie oben isoliert. Bei diesem Versuche aber bekommt man viel mehr von der letztgenannten Säure (ca. 2,3 g). Starkes Ammoniak wirkt verseifend auf das Anhydrid (Tab. IV).

Bei einem anderen Versuche wurde die überschüssige concentrirte Ammoniaklösung auf 65° erhitzt und das Anhydrid portionsweise eingetragen. Die drei Reaktionsprodukte: Diäthylmalonamid, Diäthylmalonamidsäure und Diäthylmalonsäure fanden sich in demselben Verhältnisse wie in dem vorigen bei 0° angestellten Versuche (Tab. V) vor.

Um die eventuell schädliche verseifende Wirkung des Wassers zu beseitigen, wurde folgender Versuch angesetzt: 3 g Anhydrid wurden in 10 g Benzol gelöst, der Kolben in Eiswasser gestellt und ein langsamer Strom trockenes Ammoniak durch die Benzollösung geleitet. Das Benzol wurde zu einer gallertartigen Masse, da Ausscheidung der unlöslichen Reaktionsprodukte stattfand. Man verdampft das Benzol im Vakuum und wäscht den festen Rückstand mit wenig Wasser; es bleibt Diäthylmalonamid (0,7). Das Waschwasser wurde mit Salzsäure angesäuert und ausgeäthert. Aus dem Äther wurde ein Gemisch von Diäthylmalonsäure und Diäthylmalonamidsäure gewonnen, die mit kaltem Wasser voneinander getrennt werden (Tab. VI).

Durch diesen Versuch wird also bewiesen, daß das entstandene Wasser weiter auf das Anhydrid einwirkt:



Ein zweiter Versuch, bei welchem ich die (durch Abwägen des Kolbens gemessene) nur 1 Mol. entsprechende Menge Ammoniak auf die benzolische Lösung des Anhydrids einwirken liefs, gab aufser den üblichen Reaktionsprodukten eine beträchtliche Menge unverändertes Anhydrid (Tab. VII).

Versuch in Pyridinlösung: Man stellt sich eine Ammoniaklösung von bekanntem Gehalt dar, indem man einen Strom Ammoniak in Pyridin einleitet und durch Abwägen des Kolbens die Menge des gelösten Ammoniaks bestimmt. Ich stellte mir so eine 10proz. Lösung dar.


Zu 15 g dieser Lösung, die also 1,5 g Ammoniak enthält, d. h. $2\frac{1}{2}$ Mol. für meinen Versuch, gibt man unter Kühlung 5 g Anhydrid hinzu. Dann säuert man die Flüssigkeit mit Salzsäure an, verdünnt mit wenig Wasser und filtriert das ausgeschiedene Diäthylmalonamid (1,1 g), das noch mit wenig Äther gewaschen wird, um etwas Diäthylmalonamidsäure zu entfernen. Die wässerige Flüssigkeit wird ausgeäthert und beim Eindunsten des Äthers ein Gemisch von Diäthylmalonamidsäure und Diäthylmalonsäure erhalten, welche durch Wasser getrennt werden (Tab. IX).

Einwirkung von Diäthylamin auf das hochmolekulare Diäthylmalonsäureanhydrid.


I. Versuche in der Wärme: In einem kleinen mit Rückflusskühler verbundenen Rundkolben läfst man aus dem Tropftrichter 4,5 g ($2\frac{1}{2}$ Mol.) Diäthylamin auf 3 g Anhydrid tropfen. Das Gemisch erwärmt sich, das Anhydrid löst sich auf und das Diäthylamin gerät in heftiges Sieden. Ist die Reaktion beendet, so verdünnt man mit Wasser, setzt ein wenig Soda hinzu und äthert aus. Die ätherische Lösung wird mit Natriumsulfat getrocknet, der Äther verdampft und der Rückstand im Vakuum fraktioniert. Man bekommt 2,7 g eines farblosen, schwach nach Menthol riechenden Öles, das bei 108° unter 12 mm Druck übergeht. Bei gewöhnlichem Drucke siedet es bei 219° .

Es zeigte sich identisch mit dem von Kalle u. Co.¹⁾ aus Diäthylacetylchlorid und Diäthylamin dargestellten Diäthylacetyldiäthylamid $\text{C}_2\text{H}_5 > \text{C} < \begin{smallmatrix} \text{CO} - \text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2 \\ \text{H} \end{smallmatrix}$. Diese Flüssigkeit hat die physiologische Eigenschaft, die Temperatur zu erhöhen und den Puls bedeutend zu beschleunigen. Die ausgeätherte wässrige Flüssigkeit wird dann mit Salzsäure angesäuert und nach Zusatz von Kochsalz mehrmals ausgeäthert. Durch Verdunsten des Äthers gewinnt man 0,7 g eines Öles, das sehr kurze Zeit mit Wasserdampf destilliert wird; es gehen so 0,5 g Diäthylelessigsäure über, während im Kolben 0,2 g Diäthylmalonsäure zurückbleiben (Tab. IX).



Bei einem zweiten Versuch wurde 1 Mol. Diäthylamin zu 1 Mol. Anhydrid zugetropft. Die Verarbeitung der Flüssigkeit erfolgte wie im ersten Versuche. Es entstanden die gleichen Produkte, auch in derselben Ausbeute (Tab. X). Die Einwirkung von Diäthylamin in der Wärme kann also folgenderweise für die Hauptreaktion formuliert werden:



Versuche in der Kälte: Diäthylamin reagiert nicht wie Ammoniak. Es war immer ein Diamid von der Formel $\text{C}_2\text{H}_5 > \text{C} < \begin{smallmatrix} \text{CO} - \text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2 \\ \text{CO} - \text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2 \end{smallmatrix}$ nicht zu erhalten; es entsteht aber leicht eine Amidsäure von der Formel $\text{C}_2\text{H}_5 > \text{C} < \begin{smallmatrix} \text{CON}(\text{C}_2\text{H}_5)_2 \\ \text{COOH} \end{smallmatrix}$ und auch Diäthylmalonsäure. Ausser diesen zwei letztgenannten Produkten erhält man auch Diäthylacetyldiäthylamid $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{CHCON}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$. Dieser Körper kann wohl durch Zersetzung der Diäthylmalondiäthylamidsäure entstehen:



Die Hauptreaktion verläuft in folgendem Sinne:



1) Patentanmeldung Nr. 127 889.

Zu 7,5 g Diäthylamin ($2\frac{1}{2}$ Mol.) wurden unter Kühlung (mit Kältemischung) und fortwährendem Umrühren 5 g Anhydrid in kleinen Portionen zugesetzt. Das Gemisch wird dickflüssig und färbt sich intensiv braun. Es tritt auch Geruch nach Diäthylacetdiäthylamid auf. Wenn das Anhydrid gelöst ist, verdünnt man die Flüssigkeit vorsichtig mit wenig Wasser und schüttelt sie mehrmals mit Äther aus. Die ätherische Lösung wird getrocknet und destilliert. Sie enthielt 2,3 g Diäthylacetdiäthylamid.

Die ausgeätherte Lösung wurde unter Kühlung angesäuert, mit Kochsalz ausgesalzen und ausgeäthert. Nach dem Verdampfen des Äthers im Vakuum blieben 2,9 g eines gelben Öles, das als ein Gemenge von Diäthylmalonsäure und Diäthylmalondiäthylamidsäure erkannt wurde (Tab. XI).

Um diese zwei Körper zu trennen, verfährt man immer folgenderweise: Das Öl wird mit wenig Wasser verdünnt und so lange mit Soda versetzt, bis es ganz gelöst ist. Man neutralisiert sehr sorgfältig mit Essigsäure, um die verseifende Wirkung des Alkalis zu beseitigen und dunstet die Lösung ein, anfangs auf dem Wasserbad, zuletzt im Vakuum. Wenn der Rückstand eine weißse wasserfreie Masse geworden ist, wäscht man ihn mit wenig absolutem Alkohol. Das Natriumsalz der Diäthylmalonsäure bleibt ungelöst und kann mit Salzsäure zerlegt werden. Die alkoholische Flüssigkeit aber wird mit wenig Salzsäure angesäuert und im Vakuum eingedunstet. Der ölige Rückstand wird mit warmem Chloroform extrahiert und durch dieses vom Kochsalz getrennt. Dampft man das Chloroform ein, so bleibt ein Öl, das, in viel Ligroin gelöst, beim langsamen Eindunsten des Lösungsmittels in langen Nadeln auskristallisiert. Es ist Diäthylmalondiäthylamidsäure, $\text{C}_2\text{H}_5 > \text{C} < \begin{matrix} \text{CON}(\text{C}_2\text{H}_5)_2 \\ \text{COOH} \end{matrix}$, die bei $88-90^\circ$ schmilzt unter CO_2 -Verlust und Bildung von Diäthylacetdiäthylamid. Sie ist leicht in Chloroform, Äther, Benzol oder Alkohol, schwerer in Ligroin und in Wasser löslich.

Analysen: 0,2438 g Subst. gaben 0,5500 g CO_2 und 0,2145 g H_2O .
0,1606 g Subst. gaben $9,5 \text{ cm}^3$ N bei 16° und 714 mm.

Ber. auf $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{O}_3\text{N}$:

C 61,34 %

H 9,76 %

N 6,51 %

Gefunden:

61,52 %

9,77 %

6,51 %

Da die Reaktion unter grofser Wärmeentwicklung stattfindet, wenn man direkt Diäthylamin und Diäthylmalonsäureanhydrid aufeinander einwirken läfst, so verdünnte ich das Diäthylamin einmal mit Benzol und einmal mit Äther und setzte unter Kühlung das Anhydrid hinzu. Es schied sich bald ein Körper aus, ein Salz der Diäthylmalonsäure; die Hoffnung aber, nach dieser Methode kein Diäthyl-

Übersicht der Versuche.

Ver- such	Substanz	Mol.- Zahl	Lö- sungs- mittel	Tempe- ratur	Diäthyl- malon- amid	Diäthyl- acet- amid	Diäthyl- malon- amid- säure	Diäthyl- malon- säure	Unver- änder- tes An- hydrid
I	NH ₃	2 $\frac{1}{2}$	Wasser	0°	28 %	—	30,4 %	28,2 %	—
II	"	1	"	0°	15	—	12,2	40,2	14 %
III	"	2	"	0°	15,6	—	20,3	40,5	10
IV	NH ₃ conc.	Überschufs	"	0°	17,2	—	27,0	45,2	—
V	"	"	"	65°	19	—	20,2	44,8	—
VI	NH ₃	"	Benzol	5°	21	—	32,1	32,2	—
VII	"	1	"	5°	13	—	20	38,2	14
VIII	"	2 $\frac{1}{2}$	Pyridin	0°	17,3	—	25,5	42,3	—
IX	Diäthylamin	2 $\frac{1}{2}$	—	56°	—	67,6 %	—	5,4	—
X		1	—	56°	—	61,6	—	6,2	—
XI		2 $\frac{1}{2}$	—	-10°	—	37,8	34,8	14,2	—
XII		1	Äther	-10°	—	28,2	20,2	40,1	—
XIII		1	Benzol	5°	—	21,7	24,5	42,3	—
XIV		2 $\frac{1}{2}$	Wasser	0°	—	10,0	40,1	30,9	—
Ver- such	Substanz	Mol.- Zahl	Lö- sungs- mittel	Tempe- ratur	Diäthyl- malon- diäthyl- amid	Diäthyl- acet- diäthyl- amid	Diäthyl- malon- diäthyl- amidsr.	Diäthyl- malon- säure	Unver- änder- tes An- hydrid

acetdiäthylamid als Zersetzungsprodukt zu bekommen, erfüllte sich nicht. Dieser Körper tritt also immer auf, selbst wenn man die Reaktion in sehr verdünnten Lösungen und weit unter 0° ausführt. Er scheint also wohl aus der Diäthylmalondiäthylamidsäure zu entstehen (Tab. XII, XIII).

In wässriger Lösung: 7,5g Diäthylamin werden mit der gleichen Menge Wasser verdünnt und zu der gut abgekühlten Lösung nach und nach 5g Anhydrid hinzugefügt. Es löst sich unter Braunfärbung. Man läßt noch eine Stunde in der Kälte stehen und äthert die Flüssigkeit aus, um etwas Diäthylacetdiäthylamid zu entfernen, säuert an und äthert wieder aus. In dieser ätherischen Lösung finden sich Diäthylmalondiäthylamidsäure und Diäthylmalonsäure, die auf die oben angegebene Weise getrennt werden. Die Ausbeute an Diäthylmalondiäthylamidsäure ist ziemlich gut. Sie beträgt ungefähr 40 % der Theorie (3g) (Tab. XIV).


Einwirkung von Natriumalkoholat auf das hochmolekulare Diäthylmalonsäureanhydrid.

Das hochmolekulare Diäthylmalonsäureanhydrid löst sich schwer, aber unverändert in Alkohol auf; beim längeren Kochen liefert es aber Diäthylmalonester, Diäthylessigester und Diäthylmalonsäure. In gleicher Weise wird es durch Natriumalkoholat verändert, mit welchem die Reaktion leichter erfolgt.


5g rohes Anhydrid werden mit 30ccm absolutem Alkohol in einem kleinen, mit Rückfluschkühler verbundenen Kolben versetzt. Dann fügt man unter Kühlung 1g Natrium hinzu. Das Anhydrid löst sich schnell auf. Man erwärmt dann sehr kurze Zeit auf dem Wasserbade und verdampft den überschüssigen Alkohol im Vakuum. Es bleibt ein öliges Rückstand, welcher in wenig Wasser aufgenommen und ausgeäthert wird. Die ätherische Flüssigkeit wird getrocknet, der Äther abgedampft und der Rückstand destilliert. Bei 148—150° gehen 1,6g Diäthylessigsäureester über und bei 220° 1g Diäthylmalonester. Die ausgeätherte wässrige Lösung ist noch stark alkalisch. Sie wird mit Salzsäure angesäuert und wieder ausgeäthert. Nach dem Verdampfen des Äthers bleibt eine kristallinische Masse zurück, der etwas Öl beigemischt ist. Man löst sie in wenig Soda und dunstet im Vakuum ein. Der feste Rückstand wird mit wenig wasserfreiem warmen Alkohol extrahiert.

Ungelöst bleibt das Natriumsalz der Diäthylmalonsäure (1,2g). Der alkoholische Auszug wird im Vakuum eingedampft, der Rückstand mit Salzsäure angesäuert und ausgeäthert. Die ätherische Lösung hinterläßt beim Verdunsten eine Flüssigkeit, die fraktioniert wird. Sie siedet bei 150°, aber unter CO₂-Verlust. Das Destillationsprodukt erweist sich als Diäthylessigsäureester (1,1g).

Ich hatte also vorher Diäthylmalonestersäure¹⁾, die ein in Alkohol lösliches Natriumsalz gebildet hatte. Die Fraktionierung aber gab Diäthylelessigsäure auf folgende Weise:



Die Einwirkung von Natriumalkoholat ist ganz analog der von Ammoniak; ich bekomme Diäthylmalonester, Diäthylmalonestersäure und Diäthylmalonsäure. Außerdem Diäthylelessigester, der wohl von einer Zersetzung der Diäthylmalonestersäure herrührt. Die vier Prozesse sind die folgenden:




Über das Verhalten des hochmolekularen Diäthylmalonsäure-anhydrides beim Erwärmen.

10 g rohes Anhydrid werden in wasserfreiem Benzol gelöst und einige Zeit auf dem Wasserbade gekocht. Es entweicht Kohlensäure wie die Prüfung mit Barytwasser zeigt. Nach einer halben Stunde destilliert man das Benzol im Vakuum ab. Der ölige Rückstand wird dann mit sehr wenig eines Gemisches von Äther und Essigäther behandelt. Es scheidet sich sofort ein weißer fester Körper ab. Er wird abgesaugt, mit wenig Äther gewaschen und getrocknet; die Ausbeute beträgt 2 g. Der Körper erwies sich bei näherer Untersuchung als das tetramolekulare Anhydrid der Diäthylmalonsäure. Das Filtrat wird mit Äther verdünnt und über Nacht mit frisch ge-

1) Die Säure wurde bis jetzt nicht beschrieben.

glühtem Natriumsulfat getrocknet. Dann wird der Äther abdestilliert und der Rückstand der Vakuumdestillation unterworfen. Es gehen bei 120° unter 12 mm Druck 4 g einer Flüssigkeit über, die bei gewöhnlichem Drucke bei 226—229° siedet. Es ist Diäthylessigsäureanhydrid. Eine Probe wurde mit conc. Ammoniak behandelt. Unter starker Erwärmung schied sich ein weißer kristallinischer Körper aus, der bei 105° schmolz und alle Eigenschaften des Diäthylessigsäureamids besaß.

In dem Destillierkolben blieb eine geringe Menge eines braunen Zersetzungsproduktes, das nicht weiter untersucht wurde. Die Zersetzung des Anhydrids in der Wärme erfolgt folgendermassen:



Tetramolekulares Diäthylmalonsäureanhydrid.



Es entsteht, wie gesagt, bei der Zersetzung des hochmolekularen Anhydrids und läßt sich aus Essigäther umkristallisieren. Es scheidet sich in schönen farblosen rhombischen Tafeln aus, die bei 220° schmelzen. Dabei entsteht etwas Kohlensäure und Diäthylessigsäureanhydrid, während der größte Teil der Substanz in den kälteren Teilen des Röhrchens wieder fest wird. Es ist unlöslich in Wasser und Alkohol, sehr wenig in Äther, leicht in kaltem Benzol und in kochendem Essigäther.

Analysen: 0,2277 g Subst. gaben 0,1467 g H₂O und 0,4914 g CO₂.

0,1972 g Subst. gaben 0,1260 g H₂O und 0,4269 g CO₂.

Ber. auf C₇H₁₀O₃:

Gefunden:

C 59,15 %

58,87 % 59,04 %

H 7,03 %

7,16 % 7,10 %

Molekulargewichtsbestimmung: 0,5431 g Subst. gaben in 20,9 g Benzol gelöst eine Erniedrigung des Gefrierpunktes von 0,228°. K = 50.

Ber. auf (C₇H₁₀O₃)₄ = 568. Gef.; 569,3.


0,3036 g Subst. in 20 g Benzol gelöst gaben eine Erniedrigung des Gefrierpunktes von 0,139°. K = 50.

Ber. (C₇H₁₀O₃)₄ = 568. Gef.; 541,5.

Das Anhydrid ist also tetramolekular.

Verseifung des tetramolekularen Anhydrids: 1 g des Anhydrids wurde mit überschüssiger Kalilauge 1/1 stehen gelassen. Die Verseifung erfolgt sehr langsam und dauert ungefähr ein paar Tage. In der Wärme geht sie etwas schneller. Das Anhydrid geht quantitativ in Diäthylmalonsäure über.

Einwirkung von Ammoniak auf das tetramolekulare Anhydrid: 1 g des Anhydrids wurde mit überschüssigem conc. wässrigem Ammoniak behandelt. Die Einwirkung ist erst nach 24 Stunden (in der Kälte) beendet. Man filtriert von dem entstandenen Diäthylmalonamid (0,4 g = 36 %) ab, säuert das Filtrat an und äthert es aus. Der Ätherrückstand besteht aus einem Gemenge von Diäthylmalonamidsäure und Diäthylmalonsäure. Man behandelt es mit kaltem Wasser, wobei die Diäthylmalonamidsäure (0,45 g = 42 %) ungelöst bleibt. Aus der wässrigen Flüssigkeit gewinnt man durch Eindampfen Diäthylmalonsäure (0,2 g = 18 %). Das tetramolekulare Anhydrid reagiert mit Ammoniak träger, aber ganz in demselben Sinne wie das dodekamolekulare Anhydrid:



Dodekamolekulares Dimethylmalonsäureanhydrid.



23,7 g Pyridin (3 Mol.) werden in 150 ccm Wasser gegossen und unter starker Kühlung 16,8 g Dimethylmalonylchlorid nicht zu langsam hinzugesetzt. Man filtriert sofort den ausgeschiedenen weissen Niederschlag ab und wäscht ihn gut zuerst mit Eiswasser, dann mit schwach mit Salzsäure angesäuertem Wasser und wieder mit Eiswasser. Der Körper wird dann auf Ton gepresst und im Vakuumexsikkator aufbewahrt. Das Dimethylmalonsäureanhydrid bildet ein schneeweisses Pulver, das bei 145—148° schmilzt. Es läßt sich nicht umkristallisieren und zieht rasch Feuchtigkeit an, die es in Diäthylmalonsäure verwandelt. Kohlensaure Alkalien verseifen es momentan. Mit wässrigem Ammoniak gibt es Dimethylmalonamid und Dimethylmalonsäure, aber keine Dimethylmalonamidsäure. Das dodekamolekulare Dimethylmalonsäureanhydrid ist unlöslich in Wasser und löst sich sehr schwer in Benzol und Äthylenbromid, in Äther gar nicht. Durch Kochen

mit Essigäther oder Benzol liefs sich kein neues Produkt isolieren wie beim Diäthylmalonsäureanhydrid. Es entweicht zwar Kohlensäure, in der Flüssigkeit findet sich etwas Dimethylmalonsäure, aber kein Dimethyllessigsäureanhydrid.

Für die Analysen und Molekulargewichtsbestimmungen wurde der trockene Körper mehrmals mit wasserfreiem Äther gewaschen, um etwa beigemengte Säure zu entfernen und im Vakuum schnell vom Äther befreit. Man soll ihn sofort verwenden, denn wenn er feucht im Exsikkator steht, so wird er teilweise verseift.

0,2652 g Subst. gaben 0,5078 g CO_2 und 0,1312 g H_2O .

Ber. auf $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_3$:

C 52,62 %

H 5,26 %

Gefunden:

52,22 %

5,50 %

Molekulargewichtsbestimmungen: 0,1371 g Subst. gaben in 12 g Benzol eine Erniedrigung von 0,040°. $K = 50$.

Ber. auf $(\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_3)_{12} = 1368$. Gef.: 1428.

0,2225 g Subst. in 30 g Äthylenbromid gelöst gaben eine Erniedrigung des Gefrierpunktes von 0,065°.

Ber. auf $(\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_3)_{12} = 1368$. Gef.: 1346.

Dieses Anhydrid erweist sich also auch als dodekamolekular. Seine geringe Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln erlaubte nicht, andere Bestimmungen auszuführen um zu sehen, ob er auch oktomolekular sein kann wie das Diäthylmalonsäureanhydrid.

Einwirkung von Pyridin auf Äthylmalonylchlorid.

Durch Behandeln von Äthylmalonylchlorid mit wässriger Pyridinlösung nach der oben geschilderten Methode liefs sich ein Anhydrid der Äthylmalonsäure nicht gewinnen. Es war keine Ausscheidung eines neuen Körpers zu bemerken. Deshalb wurde eine Lösung von Pyridin und eine von Äthylmalonylchlorid in wasserfreiem Benzol hergestellt und die beiden Lösungen unter Kühlung gemischt.¹⁾ Dann wurden einige Tropfen Wasser unter kräftigem Schütteln hinzugesetzt. Die dicke braune Ausscheidung von salzsaurem Pyridin löste sich momentan auf, es trat Wärme auf, die man durch Kühlung unschädlich machen mufs. Die benzolische Lösung

1) Die Flüssigkeit wird tiefbraun gefärbt und es scheidet sich salzsaures Pyridin.

wird sofort vom Wasser getrennt. Sie wurde noch ein paar Mal mit Wasser gewaschen und über frisch geglühtem Natriumsulfat getrocknet. Nach dem Abdampfen des Benzols im Vakuum hinterbleibt ein gelbliches Öl, das nicht zu reinigen ist. Es enthält öfters Äthylmalonsäure, auch Chlor, öfters etwas Pyridin. Will man es zur Reinigung mit Alkalien oder Säuren behandeln, so löst sich das ganze Produkt auf, ohne einheitliche Zersetzungsprodukte zu geben. Analysen konnten auch nicht ausgeführt werden.

Einwirkung von Malonylchlorid auf Pyridin.

Malonylchlorid mit wässriger Pyridinlösung behandelt gibt keine Ausscheidung eines unlöslichen Körpers. Darum mußte ich wieder in indifferenten Lösungsmitteln meine Versuche anstellen.

Zu einer Lösung von 4 g Pyridin in 10 g Benzol läßt man unter Kühlung eine Lösung von 2 g Malonylchlorid hinzutropfen. Es bildet sich ein voluminöser brauner Niederschlag. Man dekantiert dann das Benzol, das beim Eindunsten keinen nennenswerten Rückstand hinterläßt, und versetzt die Masse mit etwas Wasser. Salzsäures Pyridin geht in Lösung und ein braunes Pulver bleibt zurück. Es wird mit Wasser, verd. Säuren und wieder mit Wasser gewaschen.

Beim Extrahieren des Pulvers mit Xylol geht ein Teil in Lösung und bleibt beim Verdunsten der Lösung als gelbbraunes kristallinisches Pulver zurück. Das Produkt schmilzt bei 190—195° unter Zersetzung und gibt bei der Analyse ganz verschiedene Werte: $C = 43,83$, $H = 1,87$, $C = 48,02$, $H = 2,3\%$. Der Rest des rotbraunen Pulvers, der nicht vom Xylol gelöst worden war, löste sich nur in Alkalien und in starken Säuren unter tiefbrauner Färbung. Dieses Gemenge gab auch verschiedene Werte: $C = 48,85$, $H = 2,62$, $C = 55,92$, $H = 2,95$. Es verkohlt bei hoher Temperatur ohne zu schmelzen.

Ich konnte diese Körper nicht als identisch mit den von Diels und Wolf¹⁾ als Polymere des Kohlensuboxyds beschriebenen betrachten, da sie im Gegensatz zu diesen Polymeren Wasserstoff enthalten. Dagegen nähern sie sich in ihrer Zusammensetzung und ihrem Verhalten (Unschmelzbarkeit, Löslichkeit in Alkalien) dem von Leuchs²⁾ als Nebenprodukt beim Erhitzen von Malonesterchlorid erhaltenen Körper, der die Prozentformel $C = 50,00$, $H = 2,3\%$ besaß.

1) Ber. 39, 690 [1906].

2) Ber. 39, 2641 [1906].

Lebenslauf.

Ich, Heinrich von Diesbach, wurde als Sohn des Herrn Grafen Maximilian von Diesbach in Romont, Kanton Freiburg in der Schweiz, am 15. Mai 1880 geboren.

Nach Absolvierung (baccalaureat des lettres) der französischen humanistischen Abteilung des Kantonalgymnasiums „Collège Saint Michel Fribourg“ studierte ich Chemie, zuerst fünf Semester an der Universität Freiburg in der Schweiz, während welcher Zeit ich auch meiner Militärdienstpflicht genügte. Im April 1902 trat ich in die anorganische Abteilung des chemischen Universitätslaboratoriums München, Juni 1903 unterzog ich mich dem Verbandsexamen, im Januar 1905 dem Doktorandum und begann dann unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Einhorn die vorliegende Arbeit „Über Derivate substituierter Malonsäuren“, welche vier Semester in Anspruch nahm.

